




අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2012

අැගයිමි වාර්තාව

10 - සංයුක්ත ගණිතය




පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව,
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව,
ජාතික අැගයිමි හා පරීක්ෂණ සේවාව.

අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2012

අැගයිම් වාර්තාව

10 - සංයුක්ත ගණිතය



පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව
ජාතික අැගයිම් හා පරීක්ෂණ සේවාව,
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.

සංයුක්ත ගණිතය

ඇගයීම් වාර්තාව - අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2012

මූල අනුග්‍රහය

අනාගත දැනුම් කේන්ද්‍රීය පදනම ලෙස පාසල්
පද්ධතිය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
(TSEP-WB) මගිනි.

හැඳින්වීම

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය, ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීයික අධ්‍යාපනයේ අවසාන සහතිකකරණ විභාගයයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීයික අධ්‍යාපනය අවසානයේ සිසුන්ගේ සාධන මට්ටම සහතික කිරීම මෙම විභාගයේ ප්‍රධාන අරමුණ වුව ද ජාතික විශ්වවිද්‍යාලවලට, වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවලට මෙන් ම ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට සුදුස්සන් තෝරා ගැනීම ද මෙම විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත සිදු කෙරෙන බැවින් සාධන පරීක්ෂණයක් වශයෙන් මෙන්ම තේරීමේ පරීක්ෂණයක් වශයෙන් ද අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය, ඉතා වැදගත් තත්ත්වයක් උසුලයි. එමෙන්ම තෘතීයික මට්ටමේ රැකියා සඳහා ද ප්‍රවේශ සුදුසුකම් සහතික කෙරෙන විභාගයක් වශයෙන් මෙය පිළිගැනේ. 2012 වර්ෂයේ දී මෙම විභාගය සඳහා 196 954ක් පාසල් අයදුම්කරුවෝ ද 10 954ක් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෝ ද පෙනී සිටියහ.

මෙම විභාගයෙන් උසස් සාධන මට්ටමක් ලබා ගැනීම සඳහා සිසුහු ද ඔවුන්ගේ එම අපේක්ෂා සපුරාලීම සඳහා ගුරුවරු හා දෙමව්පියෝ ද දැඩි වෙහෙසක් දරති. මෙම ඇගයීම් වාර්තාව සකස්කර ඇත්තේ ඔවුන්ගේ එම අපේක්ෂා ඉටුකරගැනීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සහාය දීමක් වශයෙනි. මෙම ඇගයීම් වාර්තාවේ ඇතුළත් තොරතුරු විභාග අපේක්ෂකයින්ට, ගුරු හවතුන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට, ගුරු උපදේශක මහත්ම මහත්මීන්ට, විෂයභාර අධ්‍යක්ෂවරුන්ට, දෙගුරුන්ට හා අධ්‍යාපන පර්යේෂකයින්ට එක සේ ප්‍රයෝජනවත් වනු නොඅනුමාන ය. එබැවින් මෙම වාර්තාව වැඩි පිරිසකගේ පරිශීලනය සඳහා යොමු කිරීම වඩාත් සුදුසු වේ.

මෙම ඇගයීම් වාර්තාව, I, II හා III යනුවෙන් කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

අ.පො.ස.(උ.පෙළ) සංයුක්ත ගණිතය විෂයයෙහි විෂය අභිමතාර්ථ හා විෂය සාධනය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වාර්තාවේ I කොටසෙහි අඩංගු වේ. ඒ යටතේ විෂයය සඳහා පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව, ඔවුන් ශ්‍රේණි ලබාගෙන ඇති ආකාරය, දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පාසල් අයදුම්කරුවන් ශ්‍රේණි ලබාගෙන ඇති ආකාරය, පන්ති ප්‍රාන්තර අනුව ලකුණු ව්‍යාප්තිය යන විෂය සාධනය පිළිබඳ සංඛ්‍යානමය තොරතුරු ද සංයුක්ත ගණිතය විෂයයේ I හා II පත්‍රවල ප්‍රශ්න තෝරාගෙන ඇති ආකාරය, එම ප්‍රශ්නවලට හා එම එක් එක් ප්‍රශ්නයෙහි කොටස්වලට ලකුණු ලබාගෙන ඇති ආකාරය සවිස්තරාත්මකව දැක්වෙන විෂය සාධනය පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් ද අන්තර්ගත වේ. අ.පො.ස.(උ.පෙළ) 2012 විභාගයේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයයෙහි I හා II ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න හා එම ප්‍රශ්නවලට අයදුම්කරුවන් පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වාර්තාවේ II කොටසෙහි අඩංගු වෙයි. ඒ යටතේ I හා II ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා සංවර්ධනාත්මක යෝජනා අන්තර්ගත වේ.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව මගින් උත්තර පත්‍ර ඇගයීමේ නිරත වූ ප්‍රධාන, අතිරේක ප්‍රධාන හා සහකාර පරීක්ෂකවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන තොරතුරු, නිරීක්ෂණ, අදහස් හා යෝජනා ද සම්භාව්‍ය පරීක්ෂණ න්‍යාය (Classical Test Theory) හා අයිතම ප්‍රතිචාර න්‍යාය (Item Response Theory) යොදාගනිමින් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිචාර විශ්ලේෂණය මගින් ලබාගත් තොරතුරු ද මෙම ඇගයීම් වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා පදනම් කරගෙන ඇත.

ප්‍රශ්න පත්‍රවල එක් එක් ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමේ දී අපේක්ෂකයන් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ද ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්යය පිළිබඳ අදහස් හා යෝජනා ද මෙම වාර්තාවෙහි III කොටසෙහි ඇතුළත් කර ඇත. විවිධ නිපුණතා හා එම නිපුණතා මට්ටම්වලට ළඟාවීම සඳහා ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සංවිධානය කරගත යුතු ආකාරය පිළිබඳ ව මෙයින් මහත් පිටිවහලක් ලැබෙනු ඇතැයි සිතමි.

ඉදිරියේදී සම්පාදනය කරනු ලබන ඇගයීම් වාර්තාවල ගුණාත්මක වර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා ඵලදායී අදහස් හා යෝජනා අප වෙත යොමුකරන ලෙස කාරුණික ව ඉල්ලමි.

මෙම වාර්තාව සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයූ ප්‍රධාන, අතිරේක ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරුන්ට හා සහකාර පරීක්ෂකවරුන්ටත්, උනන්දුවෙන් හා සක්‍රීයව දායක වූ සැකසුම් කමිටු සාමාජිකයින්ටත්, වගකීමෙන් කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලයටත් මුද්‍රණය කර දුන් රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවටත් ඒ සඳහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වූ අනාගත දැනුම් කේන්ද්‍රීය පදනම ලෙස පාසල් පද්ධතිය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (TSEP-WB)ටත් මාගේ හෘදයාංගම ස්තූතිය පළ කරමි.

ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පූජ්‍යකුමාර
විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

2013 දෙසැම්බර් 01 දින
බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාවේ දී ය.

උපදේශකත්වය	:	ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්
මෙහෙයවීම හා සංවිධානය	:	ගයාත්‍රී අබේගුණසේකර විභාග කොමසාරිස් (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන)
සම්බන්ධීකරණය	:	ඊ. කුලසේකර නියෝජ්‍ය විභාග කොමසාරිස්
සංස්කරණය	:	ආචාර්ය ජගත් කේ. විජේරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ගණිත අධ්‍යයනාංශය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ආචාර්ය එස්.එස්. නිශාන්ත පෙරේරා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ගණිත අධ්‍යයනාංශය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ඊ. කුලසේකර නියෝජ්‍ය විභාග කොමසාරිස්
සැකසුම් කමිටුව	:	සී. බමුණුගේ ඩී.එස්. සේනානායක විදුහල කොළඹ 07 එච්.කේ. අමරසිලි වේල්ස් කුමර විදුහල මොරටුව එන්.එම්. මිස්ඛා සහිරා විදුහල ගම්පොල එස්.ඩී. ලොකුගමගේ ඩී.එස්. සේනානායක විදුහල කොළඹ 07
පරිගණක පිටපත සැකසුම	:	කේ.පී.ඩී. අනුෂා මදුවන්ති දිසානායක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. චතුරිකා දිසානායක පරිගණක දත්ත සටහන් ක්‍රියාකරු

I කොටස

1. විෂය අභිමතාර්ථ හා විෂය සාධනය පිළිබඳ තොරතුරු	
1.1 විෂය අභිමතාර්ථ	1
1.2 විෂය සාධනය පිළිබඳ සංඛ්‍යානමය තොරතුරු	
1.2.1 විෂයය සඳහා පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව	2
1.2.2 අයදුම්කරුවන් ශ්‍රේණි ලබාගෙන ඇති ආකාරය	2
1.2.3 ප්‍රථමවරට පෙනී සිටි පාසල් අයදුම්කරුවන් ශ්‍රේණි ලබාගෙන ඇති ආකාරය - දිස්ත්‍රික්ක අනුව	3
1.2.4 ලකුණු ලබාගෙන ඇති ආකාරය - පන්ති ප්‍රාන්තර අනුව	4
1.3 විෂය සාධනය පිළිබඳ විශ්ලේෂණය	
1.3.1 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි A සහ B කොටසෙහි ප්‍රශ්න තෝරාගෙන ඇති ආකාරය	5
1.3.2 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි A සහ B කොටස සඳහා සාධනය	6
1.3.3 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B කොටසෙහි ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු ලබාගෙන ඇති ආකාරය	6
1.3.4 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නයෙහි කොටස්වලට හා අනුකොටස්වලට පිළිතුරු සපයා ඇති ආකාරය	7
1.3.5 II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි A සහ B කොටසෙහි ප්‍රශ්න තෝරාගෙන ඇති ආකාරය	8
1.3.6 II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි A සහ B කොටස සඳහා සාධනය	9
1.3.7 II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B කොටසෙහි ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු ලබාගෙන ඇති ආකාරය	9
1.3.8 II ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා සාධනය	10

II කොටස

2. ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ තොරතුරු	
2.1 I ප්‍රශ්න පත්‍රය හා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ තොරතුරු	
2.1.1 I ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය	11
2.1.2 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය, එම ප්‍රශ්නය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුර සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා	12
2.2 II ප්‍රශ්න පත්‍රය හා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ තොරතුරු	
2.2.1 II ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය	47
2.2.2 II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය, එම ප්‍රශ්නය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුර සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා	48

III කොටස

3. පිළිතුරු සැපයීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හා යෝජනා	
3.1 පිළිතුරු සැපයීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු	80
3.2 ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අදහස් හා යෝජනා	82

I කොටස

1. විෂය අභිමතාර්ථ හා විෂය සාධනය පිළිබඳ තොරතුරු

1.1. විෂය අභිමතාර්ථ

- ★ ගණිතය වැඩිදුර අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා සිසුනට ගණිතමය මූලික කුසලතා ලබාදීම
- ★ ගණිතමය ගැටලු විසඳීමේ ක්‍රමශිල්ප පිළිබඳ අත්දැකීම් සිසුනට ලබාදීම
- ★ ගණිතමය තාර්කික වින්තනය පිළිබඳ සිසුන්ගේ ශිෂ්‍ය සම්ප්‍රජානනය වැඩිදියුණු කිරීම
- ★ ගණිතය ඉගෙනීම සඳහා සිසුන් අභිප්‍රේරණය කිරීම

සටහන :

මෙම නව විෂය නිර්දේශය මගින් ගණිතමය දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම පමණක් නොව එදිනෙදා ජීවිතයේදී ගණිතමය දැනුම භාවිත කිරීමේ කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම ද වර්ත සංවර්ධනය ද අපේක්ෂා කෙරේ.

1.2. විෂය සාධනය පිළිබඳ සංඛ්‍යානමය තොරතුරු

1.2.1 විෂයය සඳහා පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව

මාධ්‍යය	පාසල්	පෞද්ගලික	එකතුව
සිංහල	20346	288	20634
දෙමළ	3035	85	3120
ඉංග්‍රීසි	1413	84	1497
එකතුව	24794	457	25251

වගුව 1

1.2.2 අයදුම්කරුවන් ශ්‍රේණි ලබාගෙන ඇති ආකාරය

ශ්‍රේණිය	පාසල් අයදුම්කරුවන්		පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්		එකතුව	ප්‍රතිශතය
	සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිශතය	සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිශතය		
A	1396	5.63	14	3.06	1410	5.59
B	1660	6.69	15	3.28	1675	6.63
C	3795	15.31	39	8.54	3834	15.18
S	5774	23.29	67	14.66	5841	23.13
F	12169	49.08	322	70.46	12491	49.47
එකතුව	24794	100.00	457	100.00	25251	100.00

වගුව 2

1.2.3 ප්‍රථමවරට පෙනී සිටි පාසල් අයදුම්කරුවන් ශ්‍රේණි ලබාගෙන ඇති ආකාරය - දිස්ත්‍රික්ක අනුව

දිස්ත්‍රික්කය	පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව	විශිෂ්ට සම්මාන සාමර්ථය (A) ලැබූ		අධි සම්මාන සාමර්ථය (B) ලැබූ		සම්මාන සාමර්ථය (C) ලැබූ		සාමාන්‍ය සාමර්ථය (S) ලැබූ		සමත් (A+B+C+S)		අසමත් (F)	
		සංඛ්‍යාව	%	සංඛ්‍යාව	%	සංඛ්‍යාව	%	සංඛ්‍යාව	%	සංඛ්‍යාව	%	සංඛ්‍යාව	%
1. කොළඹ	3086	189	6.12	196	6.35	477	15.46	681	22.07	1543	50.00	1543	50.00
2. ගම්පහ	1561	50	3.20	70	4.48	180	11.53	326	20.88	626	40.10	935	59.90
3. කළුතර	952	30	3.15	35	3.68	93	9.77	200	21.01	358	37.61	594	62.39
4. මහනුවර	1007	51	5.06	49	4.87	152	15.09	212	21.05	464	46.08	543	53.92
5. මාතලේ	202	5	2.48	15	7.43	25	12.38	45	22.28	90	44.55	112	55.45
6. නුවරඑළිය	281	10	3.56	9	3.20	37	13.17	70	24.91	126	44.84	155	55.16
7. ගාල්ල	1083	65	6.00	62	5.72	163	15.05	212	19.58	502	46.35	581	53.65
8. මාතර	901	79	8.77	54	5.99	141	15.65	183	20.31	457	50.72	444	49.28
9. හම්බන්තොට	493	39	7.91	29	5.88	58	11.76	107	21.70	233	47.26	260	52.74
10. යාපනය	663	64	9.65	44	6.64	112	16.89	151	22.78	371	55.96	292	44.04
11. කිලිනොච්චි	51	4	7.84	4	7.84	7	13.73	10	19.61	25	49.02	26	50.98
12. මන්නාරම	46	2	4.35	3	6.52	4	8.70	13	28.26	22	47.83	24	52.17
13. වවුනියාව	87	7	8.05	5	5.75	17	19.54	14	16.09	43	49.43	44	50.57
14. මුලතිව්	44	1	2.27	2	4.55	2	4.55	16	36.36	21	47.73	23	52.27
15. මඩකලපුව	191	15	7.85	15	7.85	26	13.61	39	20.42	95	49.74	96	50.26
16. අම්පාර	456	11	2.41	28	6.14	48	10.53	114	25.00	201	44.08	255	55.92
17. ත්‍රිකුණාමලය	155	3	1.94	9	5.81	21	31.00	91	58.71	124	80.00	31	20.00
18. කුරුණෑගල	1117	33	2.95	49	4.39	116	10.38	254	22.74	452	40.47	665	59.53
19. පුත්තලම	357	10	2.80	25	7.00	43	12.04	82	22.97	160	44.82	197	55.18
20. අනුරාධපුරය	429	13	3.03	14	3.26	49	11.42	102	23.78	178	41.49	251	58.51
21. පොළොන්නරුව	130	2	1.54	3	2.31	14	10.77	25	19.23	44	33.85	86	66.15
22. බදුල්ල	455	17	3.74	18	3.96	51	11.21	116	25.49	202	44.40	253	55.60
23. මොනරාගල	169	3	1.78	4	2.37	24	14.20	34	20.12	65	38.46	104	61.54
24. රත්නපුරය	656	23	3.51	31	4.73	63	9.60	128	19.51	245	37.35	411	62.65
25. කෑගල්ල	538	3	0.56	13	2.42	45	8.36	97	18.03	158	29.37	380	70.63
සමස්ත දිවයින	15110	729	4.82	786	5.20	1968	13.02	3322	21.99	6805	45.04	8305	54.96

වගුව 3

1.2.4 ලකුණු ලබාගෙන ඇති ආකාරය - පන්ති ප්‍රාන්තර අනුව

පන්ති ප්‍රාන්තරය	සංඛ්‍යාතය	සංඛ්‍යාත ප්‍රතිශතය	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය	සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ප්‍රතිශතය
91 - 100	28	0.11	25251	100.00
81 - 90	357	1.41	25223	99.89
71 - 80	1018	4.03	24866	98.48
61 - 70	1879	7.44	23848	94.44
51 - 60	2640	10.46	21969	87.00
41 - 50	3452	13.67	19329	76.54
31 - 40	3761	14.89	15877	62.87
21 - 30	3823	15.14	12116	47.98
11 - 20	3872	15.33	8293	32.84
01 - 10	4417	17.49	4421	17.51
00 - 00	4	0.02	4	0.02

වගුව 5


ඉහත වගුවෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.

උදා:-

මෙම විෂයය සඳහා 31 - 40 ප්‍රාන්තරය තුළ ලකුණු ලබාගත් සංඛ්‍යාව 3761කි. එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 14.89%කි. ලකුණු 40 හෝ ඊට අඩුවෙන් ලබා ඇති සංඛ්‍යාව 15877ක් වන අතර, එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 62.87%කි.

1.3 විෂය සාධනය පිළිබඳ විශ්ලේෂණය

1.3.1 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි ප්‍රශ්න තෝරාගෙන ඇති ආකාරය




ප්‍රස්තාරය 1 (RD/16/02/AL පෝරමයෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.)

I පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 17 අතුරෙන් A කොටසට අයත් අංක 1 සිට 10 තෙක් ප්‍රශ්න අනිවාර්ය වන අතර B කොටසට අයත් අංක 11 සිට 17 තෙක් ප්‍රශ්න අනුරෙන් ප්‍රශ්න 5ක් පමණක් තෝරාගෙන පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

ඉහත ප්‍රස්තාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.

උදා:- අයදුම්කරුවන් වැඩිම පිරිසක් 1 ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයා ඇත. එම අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය 97%ක් පමණ වේ. අඩුවෙන්ම තෝරා ගනු ලැබ ඇත්තේ 14 වන ප්‍රශ්නය වන අතර එය තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය 68%ක් පමණ වේ.

1.3.2 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි A සහ B කොටස්වලට අයත් ප්‍රශ්නවල පහසුතා දර්ශක




ප්‍රස්තාරය 2 (RD/16/05/AL පෝරමයෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.)

මෙම ප්‍රස්තාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.

උදා:- මෙම ප්‍රශ්න අතුරෙන් වැඩිම පහසුතාව ඇත්තේ 1 වන ප්‍රශ්නයට වන අතර එහි පහසුතාව 61%ක් පමණ වේ. අඩුම පහසුතාව ඇත්තේ 8 වන ප්‍රශ්නයට වන අතර එහි පහසුතාව 22%ක් පමණ වේ.

1.3.3 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B කොටසෙහි ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු ලබාගෙන ඇති ආකාරය




මෙම ප්‍රස්තාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.
 උදා: මෙහි 11 වන ප්‍රශ්නය සඳහා වෙන්


කර ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 150කි. ප්‍රස්තාරයට අනුව, එම ලකුණුවලින්, 76 - 100% ප්‍රාන්තරයේ එනම් ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයට අයත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඇත්තේ මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා පිළිතුරු සැපයූ අයදුම්කරුවන්ගෙන් 6%ක් පමණ පිරිසකි. මේ ආකාරයට එම ප්‍රශ්නය සඳහා හිමි ලකුණුවලින් 51 - 75% ප්‍රාන්තරයේ එනම් ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයට අයත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත් පිරිස 10%ක් පමණ ද ලකුණුවලින් 26 - 50% ප්‍රාන්තරයේ එනම් ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයට අයත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත් පිරිස 20%ක් පමණ ද ලකුණු 0 - 25% ප්‍රාන්තරයේ එනම් ලකුණු 0 - 35 ප්‍රාන්තරයට අයත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත් පිරිස 63%ක් පමණ ද වේ.

ප්‍රස්තාරය 3 (RD/16/02/AL පෝරමයෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.)

1.3.4 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නයෙහි කොටස්වලට හා අනුකොටස්වලට පිළිතුරු සපයා ඇති ආකාරය



ප්‍රස්තාරය 4 (RD/16/04/AL) පෝරමයෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.
 ඉහත ප්‍රස්තාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.
 උදා:- 11 ප්‍රශ්නයෙහි (a)(i) (α) කොටසෙහි පහසුතාව 42%ක් පමණ වන අතර එම ප්‍රශ්නයේ (a) (i) (β) කොටසෙහි පහසුතාව 58%ක් පමණ වේ.




ප්‍රස්තාරය 1 (RD/16/02/AL පෝරමයෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.)

II පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 17 අතුරෙන් A කොටසට අයත් අංක 1 සිට 10 තෙක් ප්‍රශ්න අනිවාර්ය වන අතර B කොටසට අයත් අංක 11 සිට 17 තෙක් ප්‍රශ්න අනුරේන් ප්‍රශ්න 5ක් පමණක් තෝරාගෙන පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

ඉහත ප්‍රස්තාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.

උදා:- අයදුම්කරුවන් වැඩිම පිරිසක් I ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයා ඇත. එම අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය 96%ක් පමණ වේ. අඩුවෙන්ම තෝරා ගනු ලැබ ඇත්තේ 14 වන ප්‍රශ්නය වන අතර එය තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය 46%ක් පමණ වේ.

1.3.6 II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි A සහ B කොටස්වලට අයත් ප්‍රශ්නවල පහසුතා දර්ශක




ප්‍රස්තාරය 2 (RD/16/05/AL පෝරමයෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.)

මෙම ප්‍රස්තාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.

උදා:- මෙම ප්‍රශ්න අතුරෙන් වැඩිම පහසුතාව ඇත්තේ 12 වන ප්‍රශ්නයට වන අතර එහි පහසුතාව 70%ක් පමණ වේ. අඩුම පහසුතාව ඇත්තේ 10 වන ප්‍රශ්නයට වන අතර එහි පහසුතාව 7%ක් පමණ වේ.


1.3.7 II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B කොටසෙහි ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු ලබාගෙන ඇති ආකාරය



මෙම ප්‍රස්තාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.

උදා: මෙහි 11 වන ප්‍රශ්නය සඳහා වෙන් කර ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 150කි. ප්‍රස්තාරයට අනුව, එම ලකුණුවලින්, 76 - 100% ප්‍රාන්තරයේ එනම් ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයට අයත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඇත්තේ මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා පිළිතුරු සැපයූ අයදුම්කරුවන්ගෙන් 12%ක් පමණ පිරිසකි. මේ ආකාරයට එම ප්‍රශ්නය සඳහා හිමි ලකුණුවලින් 51 - 75% ප්‍රාන්තරයේ එනම් ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයට අයත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත් පිරිස 16%ක් පමණ ද ලකුණුවලින් 26 - 50% ප්‍රාන්තරයේ එනම් ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයට අයත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත් පිරිස 26%ක් පමණ ද ලකුණු 0 - 25% ප්‍රාන්තරයේ එනම් ලකුණු 0 - 35 ප්‍රාන්තරයට අයත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත් පිරිස 46%ක් පමණ ද වේ.

ප්‍රස්තාරය 3 (RD/16/02/AL පෝරමයෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.)



ප්‍රස්තාරය 4 (RD/16/04/AL පෝරමයෙන් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.)
 ඉහත ප්‍රස්තාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා දී ඇත.
 උදා:- 11 ප්‍රශ්නයෙහි (a)(i) කොටසෙහි පහසුතාව 85%ක් වන අතර එම ප්‍රශ්නයේ (a)(iii) කොටසෙහි පහසුතාව 45%ක් පමණි.

II කොටස

2. ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ තොරතුරු

2.1 I ප්‍රශ්න පත්‍රය හා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ තොරතුරු

2.1.1. I ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය

කාලය පැය 03කි. මුළු ලකුණු 100කි.

- ★ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් සමන්විත ය.

A කොටස - ප්‍රශ්න දහයකි. ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 25 බැගින් ලකුණු 250කි.

B කොටස - ප්‍රශ්න හතකි. ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 150 බැගින් ලකුණු 750කි.

I පත්‍රය සඳහා මුළු ලකුණු = $(250 + 750) \div 10 = 1000 \div 10 = 100$

- ★ විභාගයේදී A කොටසට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා සපයා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය තුළ පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

2.1.2 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි ප්‍රශ්න සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා

(10) සංයුක්ත ගණිතය I - A කොටස

1 වන ප්‍රශ්නය

1. ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය යොදාගෙන, ඕනෑම n ධන නිඛිලයක් සඳහා $1+2+...+n = \frac{n(n+1)}{2}$ බව සාධනය කරන්න.

$n = 1$ විට, L.H.S. = 1 = R.H.S. වේ. (05)

එබැවින්, ප්‍රතිඵලය $n = 1$ ට සත්‍ය වේ.

$n = p$ විට ප්‍රතිඵලය සත්‍ය යැයි උපකල්පනය කරමු. මෙහි p යනු ධන නිඛිලයකි.

එවිට, $1+2+...+p = \frac{p(p+1)}{2}$ වේ. (05)

$n = p+1$ විට,

$$1+2+...+p+(p+1) = \frac{p(p+1)}{2} + (p+1) = \frac{(p+1)\{(p+1)+1\}}{2} \text{ වේ.}$$

(05) (05)

එබැවින්, ප්‍රතිඵලය $n = p+1$ ට සත්‍ය වේ.

ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය මගින් ඕනෑම n ධන නිඛිලයක් සඳහා $1+2+...+n = \frac{n(n+1)}{2}$ වේ. (05) [25]

1 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

බොහෝ අපේක්ෂකයන් $n = p+1$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය බව සාධනය කිරීමේදී අවසාන ප්‍රතිඵලය නිවැරදිව ඉදිරිපත් කර නොතිබිණි. එම ප්‍රතිඵලය $\frac{(p+1)\{(p+1)+1\}}{2}$ හෝ $\frac{(p+1)(p+1+1)}{2}$ ලෙස දැක්විය යුතුව තිබුණ ද ඒ වෙනුවට $\frac{(p+1)(p+2)}{2}$ ලෙස පමණක්

ලියා තිබිණි. එමගින්, ප්‍රතිඵලය $n = p+1$ සඳහා සත්‍ය බව සනාථ නොවේ. තවද පිළිතුර අවසානයේදී “ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය අනුව දී ඇති ප්‍රකාශය සත්‍ය බව” බොහෝ පිළිතුරුවල සඳහන් කර නොතිබිණි. එසේ වුව ද පිළිතුරු සැපයීම හොඳ මට්ටමක පැවතුණි. “ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය” යොදා ගනිමින්, දී ඇති ප්‍රතිඵලයක් ඕනෑම n ධන නිඛිලයක් සඳහා සත්‍ය බව සාධනය කිරීමේ හැකියාව සිසුන් සතුව තිබුණ ද එම ක්‍රියාවලියට අයත් පියවර සියල්ල නිවැරදිව, තර්කානුකූලව හා අනුපිළිවෙළින් ඉදිරිපත් කිරීමට සිසුන් හුරුවී නොතිබීම නිසා මුළු ලකුණු හිමිකරගත් පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අඩුවී ඇත. I පත්‍රයෙහි A කොටසෙහි දී ඇති කෙටි පිළිතුරු අපේක්ෂිත අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 10 අතුරෙන් වඩාත්ම පහසු ප්‍රශ්නය වුව ද එහි පහසුතාව 61%කට සීමාවීමට සිසුන්ගේ පිළිතුරුවල මෙම අඩුපාඩු ද හේතු වී ඇත.

2 වන ප්‍රශ්නය

2. ADDING යන වචනයේ අකුරු සියල්ලම යොදාගෙන සෑදිය හැකි පිළියෙල කිරීම් ගණන සොයන්න. මෙම පිළියෙල කිරීම්වලින් කොපමණ ගණනක ප්‍රාණාක්ෂර (vowels) වෙන්ව පවතී දැයි සොයන්න.

වචනයට අකුරු හයක් ඇති අතර එයින් අකුරු දෙකක් එකම වර්ගයේ වේ.

$$\text{අකුරු සියල්ලම ගෙන කළ හැකි පිළියෙල කිරීම් ගණන} = \frac{6!}{2!} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$$

(05)

(05)

[10]

ප්‍රාණාක්ෂර දෙකක් ඇති අතර, නම් වශයෙන් ඒවා A හා I වේ.

මෙම ප්‍රාණාක්ෂර දෙක එක අකුරක් ලෙස ගනිමින් ප්‍රාණාක්ෂර එකට සිටින ලෙස කළ හැකි

$$\text{මුළු පිළියෙල කිරීම් ගණන} = \frac{5!}{2!} = 5 \times 4 \times 3 = 60 \quad (05)$$

A හා I අකුරු මාරු කළ හැකි බැවින්, ප්‍රාණාක්ෂර එකට සිටින ලෙස කළ හැකි මුළු

$$\text{පිළියෙල කිරීම් ගණන} = 2 \times 60 = 120 \quad (05)$$

එබැවින්, ප්‍රාණාක්ෂර වෙන්ව පවතින ලෙස කළ හැකි මුළු පිළියෙල කිරීම් ගණන

$$= 360 - 120 = 240 \quad (05)$$

[15]

2 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

සංකරණ සහ සංයෝජන ආශ්‍රිත මූලික සංකල්ප පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් අවබෝධයක් නොතිබීම නිසා සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීමට සිසුනට නොහැකි වීමෙන් මෙම ප්‍රශ්නයේ පහසුතාව 31%කට සීමාවී තිබිණි. පන්ති කාමරයේදී සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කෙරෙන සරල අභ්‍යාසවල නිරතවීමේ පරිවෘත්තීය නම්, මෙම ප්‍රශ්නයට ඉතා පහසුවෙන් නිවැරදි හා සම්පූර්ණ පිළිතුරු සැපයීමේ හැකියාව සිසුන් සතුවන බව නොඅනුමාන ය.

3 වන ප්‍රශ්නය

3. p නිශ්ශුන්‍ය නියතයක් වන $(1+px)^{12}$ හි ද්විපද ප්‍රසාරණයේ x හි සංගුණකය හා x^2 හි සංගුණකය පිළිවෙලින් $-q$ හා $11q$ නම්, p හා q හි අගයන් සොයන්න.

$(1+px)^{12}$ හි ද්විපද ප්‍රසාරණයේ x පදය ${}^{12}C_1 px$ වේ.

$$x \text{ හි සංගුණකය : } {}^{12}C_1 p = -q \Rightarrow 12p = -q \rightarrow (1) \quad (05)$$

$(1+px)^{12}$ හි ද්විපද ප්‍රසාරණයේ x^2 පදය ${}^{12}C_2 p^2 x^2$ වේ.

$$x^2 \text{ හි සංගුණකය : } {}^{12}C_2 p^2 = 11q \Rightarrow 66p^2 = 11q \Rightarrow 6p^2 = q \rightarrow (2) \quad (05)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow p = -2 \text{ හෝ } 0 \text{ වේ. } (05)$$

p යනු නිශ්ශුන්‍ය නියතයක් බැවින් $p = -2$ වේ. (05)

$$(1) \text{ න් } q = 24 \text{ යැයි ලැබේ. } (05)$$

[25]

3 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

ද්විපද ප්‍රසාරණය හා nC_r සුළු කිරීම පිළිබඳ දැනුම ප්‍රමාණවත් නොවීම ද, p යනු නිශ්ශුන්‍ය නියතයක් බව දී තිබුණ ද එය සැලකිල්ලට ගෙන නොතිබීම ද නිසා පිළිතුරු ප්‍රමාණවත් තරම් සතුටුදායක වී නැත. p නිශ්ශුන්‍ය බව සඳහන් නොකර බෙදීම නිසා ද ලකුණු නොලැබී ගොස් තිබුණි.

4 වන ප්‍රශ්නය

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 \sin^2 3x - x^2 \cos x} = \frac{1}{17}$ බව පෙන්වන්න.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 \sin^2 3x - x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x}}{2 \frac{\sin^2 3x}{x^2} - \cos x} \quad (05)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x}}{18 \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right)^2 - \cos x} \quad (05)$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}}{18 \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right) \right\}^2 - \lim_{x \rightarrow 0} \cos x} = \frac{1}{18 - 1} = \frac{1}{17} \quad (05)$$

[25]

4 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

සීමාව පිළිබඳ මූලික ප්‍රමේයවල නිවැරදි භාවිත හැකියාව හීනවීම නිසා බොහෝ පිළිතුරු ප්‍රමාණවත් තරම් සතුටුදායක මට්ටමක නොතිබිණි. එබැවින් ප්‍රශ්නයේ පහසුතාව 26% තරම් අඩු මට්ටමකට පහළ බැස ඇත. සීමාව පිළිබඳ මූලික ප්‍රමේයවල භාවිත ඇතුළත් අභ්‍යාසවලදී එම එක් එක් ප්‍රමේයය යොදා ගැනෙන අවස්ථාව නිරූපණය වන සේ සකස්කර ගැනීමේ පියවර පටිපාටිය ලියා දැක්විය යුතු වුව ද බොහෝ සිසුන්ගේ පිළිතුරුවල ඒ බව දක්නට නොලැබීම අඩුපාඩුවක් මෙන්ම මුළු ලකුණු නොලැබීමට ද හේතුවකි.

5 වන ප්‍රශ්නය

5. $2e^x + 3e^{-x} = A(2e^x - e^{-x}) + B(2e^x + e^{-x})$ වන අයුරින් A හා B නියත සොයන්න.

ඒ නගින්න, $\int \frac{2e^x + 3e^{-x}}{2e^x + e^{-x}} dx$ සොයන්න.

$$2e^x + 3e^{-x} = A(2e^x - e^{-x}) + B(2e^x + e^{-x})$$

$$(2A + 2B - 2)e^x + (-A + B - 3)e^{-x} = 0 \Rightarrow A + B = 1 \text{ හා } -A + B = 3 \text{ වේ.}$$

$$\Rightarrow A = -1 \text{ හා } B = 2 \text{ වේ.}$$

(05)

(05)

[10]

$$\int \frac{2e^x + 3e^{-x}}{2e^x + e^{-x}} dx = - \int \frac{2e^x - e^{-x}}{2e^x + e^{-x}} dx + 2 \int dx = - \ln(2e^x + e^{-x}) + 2x + C, \text{ මෙහි } C \text{ යනු අභිමත}$$

(05)

(05)

(05)

නියතයකි.

[15]

5 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

A සහ B නියත නිවැරදිව සොයා තිබූ නමුදු දී ඇති අනුකලය සුදුසු පරිදි සරල අනුකලවලට වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සතුටුදායක මට්ටමක නොවීම නිසා අවසාන පිළිතුර කරා ළඟාවීමට නොහැකිවීමෙන් ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 48%කට සීමාවී ඇත. සරල අනුකල ආශ්‍රිත අභ්‍යාසවල නිරතවීමෙන් සිසුන් ලබන පරිචය මෙවැනි ප්‍රශ්නවලට සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

6 වන ප්‍රශ්නය

6. l යනු $(4, 0)$ හා $(0, 2)$ ලක්ෂ්‍ය ඔස්සේ යන සරල රේඛාවක් ද, m යනු $(2, 0)$ හා $(0, 3)$ ලක්ෂ්‍ය ඔස්සේ යන සරල රේඛාවක් ද යැයි ගනිමු. l හා m සරල රේඛාවල සමීකරණ සොයන්න. ඒ නගින්න, l හා m හි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය හා මූල ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

$$l \text{ හි සමීකරණය } \frac{y}{x-4} = \frac{2-0}{0-4} \Rightarrow 2x + 4y - 8 = 0 \Rightarrow x + 2y - 4 = 0 \text{ වේ. (05)}$$

$$m \text{ හි සමීකරණය } \frac{y}{x-2} = \frac{3-0}{0-2} \Rightarrow 3x + 2y - 6 = 0 \text{ වේ. (05)}$$

[10]

l හා m හි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන ඕනෑම සරල රේඛාවක සමීකරණය

$$x + 2y - 4 + \lambda(3x + 2y - 6) = 0 \text{ ලෙස ලිවිය හැකිය. මෙහි } \lambda \text{ යනු පරාමිතියකි. (05)}$$

$$\text{මෙම රේඛාව මූල ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන බැවින්, } \lambda = -\frac{2}{3} \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

$$\text{එබැවින්, අවශ්‍ය රේඛාවේ සමීකරණය } 2y - 3x = 0 \text{ වේ.}$$

(05)

[15]

වෙනත් ක්‍රමයක් :

මූල ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන ඕනෑම සරල රේඛාවක සමීකරණය $y - \mu x = 0$ ලෙස ලිවිය හැකිය.

මෙහි μ යනු පරාමිතියකි. (05)

l හා m හි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ වේ. (05)

රේඛාව මෙම ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන බැවින් $\mu = \frac{3}{2}$ යැයි ලැබේ.

එබැවින්, අවශ්‍ය රේඛාවේ සමීකරණය $2y - 3x = 0$ වේ. (05)

[15]

6 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

$l_1 = 0$ සහ $l_2 = 0$ සරල රේඛා දෙකෙහි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය හරහා යන ඕනෑම සරල රේඛාවක සමීකරණය λ පරාමිතියක් වන $l_1 + \lambda l_2 = 0$ මගින් දෙනු ලබන බව භාවිත කිරීම වෙනුවට බොහෝ අපේක්ෂකයන් සරල රේඛා දෙකෙහි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය සොයා පිළිතුරු සපයා තිබිණ. සිද්ධාන්ත කේන්ද්‍රීය වූ වඩාත් පහසු කෙටි ක්‍රමයක් මගින් පිළිතුරු සපයා මුළු ලකුණු උපයා ගත හැකිව තිබූ මෙම ප්‍රශ්නයට සපයා තිබූ බොහෝ පිළිතුරු දීර්ඝ වූ ද වැඩි කාලයක් අවශ්‍ය වූ ද ලකුණු උපයා ගැනීම දුෂ්කර වූ ද ඒවා බව දක්නට ලැබිණි. මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 59%ක් වන අතර මීට වඩා වැඩි පහසුතාවක් ඇති පළමුවන ප්‍රශ්නයේ ද පහසුතාව 61%ක් පමණි.

7 වන ප්‍රශ්නය

7. C නම් වක්‍රයක් $y = 4 - 4x + 3x^2 - x^3$ සමීකරණය මගින් දෙනු ලැබෙයි. C වක්‍රයට $(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේ දී අඳින ලද ස්පර්ශකයේ සමීකරණය සොයන්න. මෙම ස්පර්ශකය, $(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේ දී $y^2 = 4x$ වක්‍රයට අඳින ලද ස්පර්ශකයට ලම්බ බව පෙන්වන්න.

$(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේදී C වක්‍රයට අඳින ලද ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය

$$= \frac{dy}{dx} \bigg|_{(1, 2)} = (-4 + 6x - 3x^2) \bigg|_{x=1} = -1 \text{ වේ.}$$

(05) (05)

එබැවින්, $(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේදී C වක්‍රයට අඳින ලද ස්පර්ශකයේ සමීකරණය $\frac{y-2}{x-1} = -1$ වේ.

එනම්, $x + y - 3 = 0$ වේ. (05)

[15]

$(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේදී $y^2 = 4x$ වක්‍රයට අඳින ලද ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය

$$= \frac{dy}{dx} \bigg|_{(1, 2)} = \frac{2}{y} \bigg|_{y=2} = 1 \text{ වේ. (05)}$$

$(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේදී C වක්‍රයට අඳින ලද ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය $\times$ $(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේදී $y^2 = 4x$ වක්‍රයට අඳින ලද ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය $= (-1) \times 1 = -1$ වේ.

එබැවින්, $(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේදී C වක්‍රයට අඳින ලද ස්පර්ශකය $(1, 2)$ ලක්ෂ්‍යයේදී $y^2 = 4x$ වක්‍රයට අඳින ලද ස්පර්ශකයට ලම්බ වේ. (05)

[10]

7 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

දී ඇති ලක්ෂ්‍යයේදී වක්‍ර දෙකට ඇඳි ස්පර්ශකවල සමීකරණ නිවැරදිව සොයා ඇති නමුත් ඒවා එකිනෙකට ලම්බ බව පෙන්වීම සඳහා එම සරල රේඛා දෙකෙහි අනුක්‍රමණවල ගුණිතය -1 බව පෙන්වීම භාවිත නොකිරීමේ හේතුවෙන් මුළු ලකුණු ලබා ගැනීමේ පසුබට බවක් දක්නට ලැබිණි. ඒ හේතුවෙන් ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 40% කට සීමාවී ඇත.

8 වන ප්‍රශ්නය

8. $(2, 0)$ හා $(0, 2)$ ලක්ෂ්‍ය ඔස්සේ යන ඕනෑම වෘත්තයක සමීකරණය $x^2 + y^2 - 4 + \lambda(x + y - 2) = 0$ ලෙස ලිවිය හැකි බව පෙන්වන්න; මෙහි λ යනු පරාමිතියකි. මෙම වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය හා අරය λ ඇසුරෙන් සොයන්න.

$(2, 0)$ හා $(0, 2)$ ලක්ෂ්‍ය ඔස්සේ යන ඕනෑම වෘත්තයක සමීකරණය

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ ලෙස ලිවිය හැකිය.}$$

$$\text{එවිට, } 4 + 4g + c = 0 \text{ හා } 4 + 4f + c = 0 \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

$$\text{ඉහත සමීකරණ දෙකෙන් } f = g \text{ හා } c = -4(g + 1) \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

$$\text{එබැවින්, සමීකරණය } x^2 + y^2 + 2gx + 2gy - 4(g + 1) = 0 \text{ ලෙස ලිවිය හැකිය.}$$

$$\text{එනම්, } x^2 + y^2 - 4 + \lambda(x + y - 2) = 0; \text{ මෙහි } \lambda = 2g \text{ වේ. (05)}$$

[15]

$$\left(x + \frac{\lambda}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{\lambda}{2}\right)^2 - 4 - 2\lambda - \frac{1}{2}\lambda^2 = 0$$

$$\text{එනම්, } \left(x + \frac{\lambda}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{\lambda}{2}\right)^2 - \frac{(\lambda + 2)^2 + 4}{2} = 0$$

$$\text{වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය } \left(-\frac{\lambda}{2}, -\frac{\lambda}{2}\right) \text{ වේ. (05)}$$

$$\text{වෘත්තයේ අරය } \sqrt{\frac{(\lambda + 2)^2 + 4}{2}} \text{ වේ. (05)}$$

[10]

8 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙය, I පත්‍රයෙහි A කොටසෙහි ඇති කෙටි පිළිතුරු අපේක්ෂිත ප්‍රශ්න දහය අතුරෙන් පහසුතාව අඩුම ප්‍රශ්නයයි. එහි පහසුතාව 22% තෙක් අඩුවී තිබිණි. බණ්ඩාරක ජ්‍යාමිතිය තේමාවෙහි වෘත්තය සම්බන්ධ විෂය ඒකකය මෙන්ම මෙම ප්‍රශ්නයට පාදක කර ගනු ලැබූ විෂය කරුණු ද දුෂ්කර නොවන නමුදු අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය සාධනය කිරීම වෙනුවට සත්‍යාපනය කර තිබීම ද ලකුණු අඩුවන්නට හේතු වී තිබිණි. ප්‍රශ්නය විමසෙන ආකාරය අනුව පිළිතුර සංවිධානය කර ගැනීමට සිසුන් හුරු කරවීමේ අවශ්‍යතාව මෙහිදී අවධාරණය කළ යුතු වේ.

9 වන ප්‍රශ්නය

9. AB විෂ්කම්භයක් සහිත S වෘත්තයේ සමීකරණය සොයන්න; මෙහි $A = (1, 3)$ හා $B = (2, 4)$ වේ. තවද, S වෘත්තය ප්‍රලම්භ ලෙස කපන $(-1, 2)$ කේන්ද්‍රය සහිත වෘත්තයේ සමීකරණය සොයන්න.

S වෘත්තය මත ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක් (x, y) යැයි ගනිමු.

$$\text{එවිට, } \left(\frac{y-3}{x-1} \right) \left(\frac{y-4}{x-2} \right) = -1 \text{ යැයි ලැබේ. (10)}$$

$$\text{එනම්, } x^2 + y^2 - 3x - 7y + 14 = 0 \text{ වේ. (05)}$$

[15]

වෙනත් ක්‍රමයක් :

S වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය $(-g, -f)$ යැයි ගනිමු.

$$\text{එවිට, } -g = \frac{3}{2} \text{ හා } -f = \frac{7}{2} \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

$$S \text{ වෘත්තයේ අරය } \sqrt{\frac{(2-1)^2 + (4-3)^2}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ වේ. (05)}$$

$$\text{එබැවින්, } S \text{ වෘත්තයේ සමීකරණය } \left(x - \frac{3}{2} \right)^2 + \left(y - \frac{7}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \text{ වේ.}$$

$$\text{එනම්, } x^2 + y^2 - 3x - 7y + 14 = 0 \text{ වේ. (05)}$$

[15]

$$(-1, 2) \text{ කේන්ද්‍රය සහිත වෘත්තයේ සමීකරණය } x^2 + y^2 + 2x - 4y + k = 0 \text{ යැයි ගනිමු. (05)}$$

මෙම වෘත්තය හා S වෘත්තය ප්‍රලම්භව ජේදනය වන බැවින්

$$2 \left(-\frac{3}{2} \right) (1) + 2 \left(-\frac{7}{2} \right) (-2) = k + 14 \Rightarrow k = -3 \text{ යැයි ලැබේ.}$$

$$\text{එබැවින් වෘත්තයේ සමීකරණය } x^2 + y^2 + 2x - 4y - 3 = 0 \text{ වේ. (05)}$$

[10]

9 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙය ද සතුවදායක සාධන තත්ත්වයක් නොදක්වන ප්‍රශ්නයකි. පහසුතාව 35%ට ද වඩා අඩු ය. දී ඇති තොරතුරු අනුව, විෂ්කම්භයේ දෙකෙළවර ලක්ෂ්‍යවල ඛණ්ඩාංක දී ඇති $S = 0$ වෘත්තයේ සමීකරණය නිවැරදිව සොයා තිබුණ ද, එම $S = 0$ වෘත්තයට ප්‍රලම්භ වෘත්තයේ සමීකරණය ලබා ගැනීම සඳහා නිවැරදි යොදා ගැනීම් කර නොතිබීම ලකුණු අඩුවීමට වැඩි වශයෙන්ම බලපෑ හේතුවකි.

10 වන ප්‍රශ්නය

10. $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ යැයි ගනිමින්, $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$ බව පෙන්වන්න. $\tan\left(\frac{23}{12}\pi\right)$ හි අගය **අපෝහනය** කරන්න.

$$\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)}{1 + \tan\left(\frac{\pi}{3}\right)\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\sqrt{3} - 1}{1 + \sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{3 - 1} = 2 - \sqrt{3} \quad (05)$$

(05) (05) [15]

$$\tan\left(\frac{23\pi}{12}\right) = \tan\left(2\pi - \frac{\pi}{12}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = -(2 - \sqrt{3}) = \sqrt{3} - 2 \quad (05) \quad (05) \quad [10]$$

10 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නයට සපයා තිබූ පිළිතුරු තරමක් සතුටුදායක වී තිබූ අතර, ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 48% තෙක් වර්ධනය වී ඇත. සිසුන් බොහෝ දෙනෙකු පළමුවන කොටසට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියා තිබුණු නමුත් ඔවුන් වැඩි දෙනෙකුට අපෝහනය පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් නොමැති වීම නිසා ඊට නියමිත ලකුණු නොලැබීමෙන් මුළු ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔවුන් විසින් අහිමි කර ගෙන තිබිණි. $(0, \pi/2)$ ප්‍රාන්තරයෙන් බැහැර පිහිටි කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ගණනය කිරීමේදී කෝණවල ආවර්තමය සම්බන්ධතා හා ඒවාට අනුරූප ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත අතර ඇති සම්බන්ධතා සුදුසු ලෙස භාවිත කිරීමට සිසුන් යොමු කරවිය යුතුය.

(10) සංයුක්ත ගණිතය I - B කොටස

11 වන ප්‍රශ්නය

11.(a) $f(x) \equiv x^2 + 2kx + k + 2$ යැයි ගනිමු; මෙහි k යනු තාත්ත්වික නියතයකි.

(i) $f(x)$ යන්න $(x-a)^2 + b$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි a හා b යනු k ඇසුරෙන් නිර්ණය කළ යුතු නියත වෙයි.

කලනය භාවිතයෙන් තොරව, $f(x)$ හි හැරුම් ලක්ෂ්‍යය සොයා මෙම ලක්ෂ්‍යය අවමයක් බව පෙන්වන්න.
 $f(x)$ හි අවම අගය k ඇසුරෙන් සොයන්න.

ඒ නගිත්, $y = f(x)$ වක්‍රය

(α) $-1 < k < 2$ නම්, x -අක්ෂයට ඉහළින් මුළුමනින්ම පිහිටන බව,

(β) $k = -1$ හෝ $k = 2$ හෝ නම්, x -අක්ෂය ස්පර්ශ කරන බව,

(γ) $k < -1$ හෝ $k > 2$ හෝ නම්, x -අක්ෂය ප්‍රහින්න ලක්ෂ්‍ය දෙකක දී කපන බව පෙන්වන්න.

(ii) $k < -2$ ම නම් පමණක් m හි සියලු තාත්ත්වික හා පරිමිත අගයන් සඳහා $y = mx$ සරල රේඛාව $y = f(x)$ වක්‍රය තාත්ත්වික හා ප්‍රහින්න ලක්ෂ්‍ය දෙකක දී ඡේදනය කරන බව සාධනය කරන්න.

(b) $g(x) \equiv x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 6x + 2$ යැයි ගනිමු.

ශේෂ ප්‍රමේයය නැවත නැවත යොදාගනිමින් $(x+1)^2$ යන්න $g(x)$ හි සාධකයක් බව පෙන්වන්න.

$g(x)$ යන්න $(x-a)^2(x^2+bx+c)$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි a, b හා c යනු නිර්ණය කළ යුතු නියත වෙයි.

x හි සියලු තාත්ත්වික අගයන් සඳහා $g(x) \geq 0$ බව **අපෝහනය** කරන්න.

(a) (i) $f(x) \equiv x^2 + 2kx + k + 2 \equiv (x+k)^2 + 2 + k - k^2$, (05)

$\equiv (x-a)^2 + b$; මෙහි $a = -k$ හා $b = 2 + k - k^2$ වේ.

(05)

(05)

[15]

$-\infty$ සිට $-k$ දක්වා x වැඩි වන විට, ∞ සිට $2 + k - k^2$ අගය දක්වා $f(x)$ ශ්‍රිතය අඩු වන අතර

$-k$ සිට ∞ දක්වා x වැඩි වන විට, $2 + k - k^2$ සිට ∞ දක්වා $f(x)$ ශ්‍රිතය වැඩි වේ. (05)

එබැවින්, $x = -k$ හිදී හැරුම් ලක්ෂ්‍ය එකක් පමණක් ඇති අතර එය අවම ලක්ෂ්‍යයකි.

(05)

(05)

[15]

$f(x)$ හි අවම අගය $2 + k - k^2$ වේ. (05)

[05]

$2 + k - k^2 = (2-k)(1+k)$ ලෙස ලිවිය හැකිය.

(α) $-1 < k < 2$ නම්, එවිට $f(x)$ හි අවම අගය ධන වන අතර $f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරය x අක්ෂයට ඉහළින් මුළුමනින්ම පිහිටිය යුතු වේ. (05)

(05)

[10]

(β) $k = -1$ හෝ $k = 2$ නම්, එවිට $f(x)$ හි අවම අගය ශුන්‍ය වන අතර $f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරය x - අක්ෂය ස්පර්ශ කළ යුතු වේ. (05)

(05)

(05)

[10]

(γ) $k < -1$ හෝ $k > 2$ නම් එවිට, $f(x)$ හි අවම අගය සෘණ වන අතර $f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරය, (05)

x - අක්ෂය ප්‍රතින්ත ලක්ෂ්‍ය දෙකක දී ජේදනය කළ යුතු වේ.

(05)

[10]

(ii) $y = mx$ සරල රේඛාව $y = f(x)$ වක්‍රය ජේදනය කරයි නම් එවිට, ඕනෑම ජේදන ලක්ෂ්‍යයක පාඨකය $x^2 + 2kx + k + 2 = mx$ සමීකරණය තෘප්ත කළ යුතු වේ. (05)

එනම්, $x^2 + (2k - m)x + k + 2 = 0$ වේ. (05)

එබැවින්, $x^2 + (2k - m)x + k + 2 = 0$ ට ප්‍රතින්ත මූල දෙකක් තිබෙයි ම නම් පමණක් $y = mx$ සරල රේඛාව හා $y = f(x)$ වක්‍රය ප්‍රතින්ත ලක්ෂ්‍ය දෙකකදී ජේදනය වේ. (05)

එනම්, $(2k - m)^2 - 4(k + 2) > 0$ ම නම් පමණි. (05)

$k < -2$ ම නම් පමණක් m හි සියලු තාත්ත්වික හා පරිමිත අගය සඳහා $(2k - m)^2 - 4(k + 2) > 0$ වේ. (05)

එබැවින්, $k < -2$ ම නම් පමණක් m හි සියලු තාත්ත්වික හා පරිමිත අගය සඳහා $y = mx$ සරල රේඛාව හා $y = f(x)$ වක්‍රය ප්‍රතින්ත ලක්ෂ්‍ය දෙකකදී ජේදනය වේ. [25]

(b) $g(-1) = (-1)^4 + 4(-1)^3 + 7(-1)^2 + 6(-1) + 2 = 0$ (05)

$g(x)$ යන්න $(x + 1)$ න් බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය 0 වේ.

$\therefore (x + 1)$ යනු $g(x)$ හි සාධකයක් වේ. (05)

එබැවින්, $g(x) = (x + 1) Q(x)$ වේ; (05) මෙහි $Q(x)$ යනු $g(x)$ යන්න $(x + 1)$ න් බෙදූ විට ලැබෙන ලබ්ධිය වේ.

$Q(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 2$ වේ. (05)

$Q(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 + 4(-1) + 2 = 0$ වේ. (05)

$Q(x)$ යන්න $(x + 1)$ න් බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය 0 වේ.

එබැවින්, $Q(x) = (x + 1) R(x)$ වේ; (05) මෙහි $R(x)$ යනු $Q(x)$ යන්න $(x + 1)$ න් බෙදූ විට ලැබෙන ලබ්ධිය වේ.

$\therefore (x + 1)$ යනු $Q(x)$ හි සාධකයක් වේ. (05)

$\therefore (x + 1)^2$ යනු $g(x)$ හි සාධකයක් වේ. [35]

$R(x) = x^2 + 2x + 2$ (05)

$g(x) = (x + 1)^2 (x^2 + 2x + 2)$

$g(x) = (x - a)^2 (x^2 + bx + c)$ වේ; මෙහි $a = -1$, $b = 2$, $c = 2$ වේ. (10)

[15]


x හි සියලු තාත්ත්වික අගය සඳහා

$g(x) = (x + 1)^2 (x^2 + 2x + 2) = (x + 1)^2 \{(x + 1)^2 + 1\} \geq 0$ වේ. (05)

(05)


[10]

11 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 76.7%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 64%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 20%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 10%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 6%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 8ක් ඇති අතර (a) (ii) අනුකොටස හැර අනෙක් සියලුම අනුකොටස්වල පහසුතාව 30% ඉක්මවා ඇත. ඒවා අතුරෙන් (b)හි දෙවන අනුකොටසෙහි පහසුතාව උපරිම වන නමුත් එය 62%කට සීමා වී ඇත. අවම පහසුතාව ඇත්තේ (a)(ii) අනුකොටසට වන අතර එහි පහසුතාව 20%කි.

(11) (a) (i) බොහෝ අපේක්ෂකයන් $f(x)$ ශ්‍රිතය අපේක්ෂිත $(x-a)^2 + b$ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කර තිබූ නමුත් a සහ b නියත k ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කර නොතිබිණි. එමෙන්ම $f(x)$ ශ්‍රිතයට අවමයක් ඇති බව නිසි හේතු දැක්වීම් සහිතව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් එම අවම අගය k ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් බොහෝ අඩුපාඩු දක්නට ලැබිණි.

(α) දී ඇති අවශ්‍යතාව භාවිතයෙන්, පිළිතුර වන $-1 < k < 2$ වන විට $f(x) > 0$ වන බව ලබාගෙන නොතිබිණි.

(β) වඩා සාර්ථකව පිළිතුරු ලියා තිබිණි.

(γ) දී ඇති අවශ්‍යතාව භාවිතයෙන් පිළිතුර ලබාගෙන නොතිබිණි.

α සහ β යන අවස්ථා සඳහා වර්ග සමීකරණයක විවේචකය (Δ) යොදා ගැනීමෙන් පිළිතුරු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම ලකුණු අඩුවීමට හේතුවිය. α සහ γ කොටස්වලදී ද ප්‍රශ්නය නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන නොතිබීම නිසා ඒවායේ පහසුතා 42% සහ 35% තරම් අඩු මට්ටමකට පහළ බැස ඇත.

- (ii) මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව අඩුම කොටස මෙය වේ. මෙම කොටසෙහි පහසුතාව 20% තෙක් අඩු වී ඇත්තේ සිසුන් විසින් ප්‍රශ්නය නිවැරදිව අවබෝධ කර ගෙන නොමැති බැවින් විය යුතුය.
- (b) ශේෂ ප්‍රමේයය නැවත නැවත යොදා ගැනීම පිළිබඳ අවබෝධය සිසුන් බහුතරයකට නොමැති බව දක්නට ලැබිණ. $(x+1)^2$ යන්න $g(x)$ හි සාධකයක් බව පෙන්විය යුතුව තිබූ විට, $g(-1)=0$ බව ලබා ගැනීම බොහෝ පිළිතුරුවල දක්නට ලැබුණත් $(x+1)$ න් $g(x)$ ප්‍රකාශනය බෙදූ විට ලැබෙන ලබ්ධියෙහි ද $(x+1)$ සාධකයක් බව පෙන්වීම කෙරෙහි එම පිළිතුරු යොමු වී නොතිබිණි. ඒ හේතුවෙන් මෙම කොටසෙහි පහසුතාව සතුටුදායක මට්ටමකට ළඟා වී නොමැති බව පෙනේ.

මෙම ප්‍රශ්නය හොඳින් කියවා නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන නොතිබුණු බව පෙනී යන අතර, ඊට හේතුව, දී ඇති ප්‍රශ්නයට අදාළ මූලික ගණිත සංකල්ප පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් සිසුනට නොතිබීම විය යුතුය. එබැවින් සිසුන් තුළ මූලික සංකල්ප වර්ධනය කරවීම සඳහා මෙන්ම කළනය භාවිතයෙන් තොරව වර්ගජ ශ්‍රිතවල හැසිරීම විස්තර කිරීමට අදාළ දැනුම වර්ධනය වන සේ ඔවුන් සරල අභ්‍යාසවල නිරත කරවීම ඵලදායී වේ.

12 වන ප්‍රශ්නය

12.(a) සියලු $x \in \mathbb{R}$ සඳහා $12x^2 + 1 \equiv A(2x-1)^3 + B(2x+1)^3$ වන පරිදි A හා B නියත සොයන්න.

ඒ නමින්, $r \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $u_r = f(r) - f(r+1)$, වන පරිදි $f(r)$ නිර්ණය කරන්න; මෙහි $u_r = \frac{12r^2 + 1}{(2r-1)^3(2r+1)^3}$ වෙයි.

$\sum_{r=1}^n u_r = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n+1)^3}$ බව පෙන්වන්න.

$\sum_{r=1}^{\infty} u_r$ ශ්‍රේණිය අභිසාරී බව පෙන්වා, $\sum_{r=1}^{\infty} u_r$ හි අගය සොයන්න.

(b) එකම රූපයක, $y = |2x-1|$ හා $y = |x| + \frac{5}{3}$ හි ප්‍රස්තාරවල දළ සටහන් අඳින්න.

ඒ නමින්, $3|x| \geq |6x-3| - 5$ සඳහා වන x හි අගය කුලකය සොයන්න.

මින්දාම $k \in \mathbb{R}$ සඳහා $y = |x| - k$ හි ප්‍රස්තාරය එකම රූපයේ සලකමින්, l හි කවර අගයක් සඳහා

$3|x| = |6x-3| + l$ සමීකරණයට තාත්ත්වික විසඳුම් එකක් පමණක් තිබේ දැයි සොයන්න.

(a) සියලු $x \in \mathbb{R}$ සඳහා $12x^2 + 1 \equiv A(2x - 1)^3 + B(2x + 1)^3$ වේ.

$$x = \frac{1}{2} \text{ සඳහා } B = \frac{1}{2} \text{ වේ. (05)}$$

$$x = -\frac{1}{2} \text{ සඳහා } A = -\frac{1}{2} \text{ වේ. (05)}$$

[10]

$$\frac{12r^2 + 1}{(2r - 1)^3 (2r + 1)^3} = \frac{-\frac{1}{2} (2r - 1)^3 + \frac{1}{2} (2r + 1)^3}{(2r - 1)^3 (2r + 1)^3} \quad (05)$$

$$= \frac{1}{2(2r - 1)^3} - \frac{1}{2(2r + 1)^3} = f(r) - f(r + 1); \text{ මෙහි } f(r) = \frac{1}{2(2r - 1)^3} \quad (05) \quad [15]$$

$$u_1 = f(1) - f(2) \quad (05)$$

$$u_2 = f(2) - f(3) \quad (05)$$

.....

.....

.....

$$u_{n-1} = f(n - 1) - f(n) \quad (05)$$

$$u_n = f(n) - f(n + 1) \quad (05)$$

$$\sum_{r=1}^n U_r = f(1) - f(n + 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n + 1)^3} \quad (05) \quad (05)$$

[30]

$$\sum_{r=1}^{\infty} U_r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n U_r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n + 1)^3} \right\} = \frac{1}{2} \quad (\text{පරිමිත වේ.}) \quad (05)$$


$$\text{එබැවින් } \sum_{r=1}^{\infty} U_r \text{ ශ්‍රේණිය අභිසාරී වේ. (05)}$$

[10]

$$\sum_{r=1}^{\infty} U_r \text{ හි අගය } \frac{1}{2} \text{ වේ. (05)}$$

[05]

(b)



[30]


$$3|x| \geq |6x-3| - 5 \Rightarrow |x| + \frac{5}{3} \geq |2x-1| \quad (05)$$

එබැවින්, $3|x| \geq |6x-3| - 5$ සඳහා වන x හි අගය කුලකය $\left\{ x : -\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{8}{3} \right\}$

$$\text{හෝ } x \in \left[-\frac{2}{3}, \frac{8}{3} \right]$$

(05)

[10]



[15]

$y = |x| - k$ හි ප්‍රස්තාරය $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන විට

$$3|x| = |6x - 3| + l \Rightarrow |x| - \frac{l}{3} = |2x - 1| \quad \text{ට එක තාත්ත්වික මූලයක් පමණක් තිබේ. (05)}$$


මේ සඳහා $k = \frac{1}{2}$ විය යුතුය. (05)

$$|x| - \frac{l}{3} = |x| - \frac{1}{2} \Rightarrow l = \frac{3}{2} \quad (05)$$

[25]


(05)

12 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 94.7%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 33%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 29%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 31%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 7%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 7ක් ඇති අතර ඒවායින් කොටස් 6කම පහසුතාව 40% ට නොඅඩුවේ. අඩුම පහසුතාව ඇත්තේ අවසාන අනුකොටසට වන අතර එහි පහසුතාව 20% කි. වැඩිම පහසුතාව ඇත්තේ (a) හි පළමුවන කොටසට වන අතර එය 99%ක් තරම් ඉහළ අගයක් තෙක් වර්ධනය වී ඇත.

- (12) (a) A සහ B නියත සෙවීම බොහෝ අපේක්ෂකයන් සාර්ථකව සිදු කර තිබුණි. එසේ වුව ද අන්තර් ක්‍රමයෙන් ශ්‍රේණියේ ඓක්‍යය සෙවීමේදී අවශ්‍ය පියවර සියල්ල නිසි පරිදි ලියා නොතිබිණි. දී ඇති ශ්‍රේණිය අභිසාරී වන බව පෙන්වීමේදී ශ්‍රේණියේ මුල් පද n හි ඓක්‍යයෙහි අනන්තයට සීමාව පරිමිත බව, සීමා පිළිබඳ ප්‍රමේය භාවිත කර ලබාගෙන නොමැත. $\sum_{r=1}^{\infty} U_r$ හි අගය ද ලියා දක්වා නොතිබිණි. මෙම හේතු නිසා ප්‍රශ්නයෙහි (a) කොටසට නියමිත උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට බොහෝ සිසුන් අසමත් වී ඇත.
- (b) ප්‍රස්තාර දෙකෙහි ඡේදන ලක්ෂ්‍යවල y ඛණ්ඩාංක සඳහන් කර නොතිබීම අඩුපාඩුවකි. k අඟුණ පදයක් වන විට, දී ඇති මාපාංක ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම බොහෝ දෙනෙකුට අපහසු වී ඇත. මාපාංක ශ්‍රිත සහ සරල අසමානතා පිළිබඳ අවබෝධයන් ඒවා හැසිරවීම පිළිබඳ හැකියාවන් අඩුවීම හේතුවෙන් ප්‍රශ්නයෙහි අවසාන කොටසට නිවැරදිව ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත්තේ සිසුන් ඉතා අඩු සංඛ්‍යාවකි.

වැඩි අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාවක් මෙම ප්‍රශ්නය තෝරා ගෙන ඇත. ප්‍රශ්නයේ (a) කොටස ශ්‍රේණි ආශ්‍රිතව සුපුරුදු කරුණු විමසෙන ප්‍රශ්නයක් වුවත්, එහි (b) කොටසට පදනම් වී ඇති මාපාංක ප්‍රස්තාර පිළිබඳව සිසුනට ප්‍රමාණවත් දැනුමක් හා නිවැරදි අවබෝධයක් ලැබී නොමැති බව පෙනී යයි. එබැවින් සිසුන් තුළ ශ්‍රේණි ආශ්‍රිත මූලික සංකල්ප වන අභිසාරිතාව පිළිබඳ දැනුම ද මාපාංක ප්‍රස්තාර හා මාපාංක අසමානතා පිළිබඳ දැනුම ද වර්ධනය කිරීම සඳහා සුදුසු අතිරේක කියවීම් හා සරල අභ්‍යාස යොදා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව නිර්දේශ කළ යුතුය.

13 වන ප්‍රශ්නය

13.(a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ යනු 2×2 න්‍යාසයක් යැයි ගනිමු.

$A^2 - 3A + 2I = O$ බව පෙන්වන්න; මෙහි I යනු 2×2 ඒකක න්‍යාසය හා O යනු 2×2 ශුන්‍ය න්‍යාසය වේ.

ඒ නයින්, A^{-1} සොයන්න.

$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ යනු 2×2 න්‍යාසයක් යැයි ගනිමු.

$BA = B$ බව පෙන්වන්න.

ඒ නයින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, $BC = O$ වන පරිදි C නම් නිශ්ශුන්‍ය 2×2 න්‍යාසයක් සොයන්න.

(b) z යනු සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් යැයි ගනිමු.

$|z|^2 = z\bar{z}$ හා $|z| \geq \operatorname{Re} z$ බව සාධනය කරන්න.

ඒ නයින්, මිනුම z_1 හා z_2 සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් සඳහා $|z_1| - |z_2| \leq |z_1 - z_2|$ බව පෙන්වන්න.

$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ බව අපේක්ෂා කරන්න.

$|z - i| < \frac{1}{2}$ නම්, $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$ බව පෙන්වන්න.

$|z - i| \leq \frac{1}{2}$ හා $\frac{\pi}{2} \leq \arg z \leq \frac{2\pi}{3}$ සඳහා z සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව ආරම්භක සටහනෙහි නිරූපණය කරන ලක්ෂ්‍ය කුලකය අඩංගු R පෙදෙස අඳුරු කරන්න.

$$\begin{aligned} (a) \quad A^2 - 3A + 2I &= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (05) \\ &= \begin{pmatrix} 10 & 9 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} - \underbrace{\begin{pmatrix} 12 & 9 \\ -6 & -3 \end{pmatrix}}_{(05)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_{(05)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \quad [20] \end{aligned}$$

$$2A^{-1} = 3AA^{-1} - AAA^{-1} = 3I - A = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (05)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (05) \quad [10]$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = B \quad (05) \quad [05]$$

$$BA - B = O \Rightarrow B(A - I) = O \Rightarrow BC = O, \text{ මෙහි } C = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \quad (05) \quad (05) \quad [15]$$

(b) $z = x + iy$ යැයි ගනිමු ; මෙහි $x, y \in \mathbb{R}$ වේ.

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = \left\{ \sqrt{x^2 + y^2} \right\}^2 = |z|^2. \quad (05) \quad [05]$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2} = \sqrt{|x|^2} = |x| \geq x = \operatorname{Re} z. \quad (05) \quad (05) \quad [10]$$

$$\begin{aligned} |z_1 - z_2|^2 &= (z_1 - z_2)(\overline{z_1 - z_2}) \\ &= (z_1 - z_2)(\overline{z_1} - \overline{z_2}) \quad (05) \\ &= z_1 \overline{z_1} + z_2 \overline{z_2} - z_2 \overline{z_1} - z_1 \overline{z_2} \\ &= z_1 \overline{z_1} + z_2 \overline{z_2} - 2 \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2 \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) \quad (05) \\ &\geq |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2 |z_1 \overline{z_2}| \quad (05) \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2 |z_1| |\overline{z_2}| \\ &\geq |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2 |z_1| |z_2| \quad (05) \\ &= (|z_1| - |z_2|)^2 \quad (05) \end{aligned}$$

$$|z_1| - |z_2| \leq |z_1 - z_2| \quad [25]$$


$$|z_1| = |(z_1 + z_2) - z_2| \geq |z_1 + z_2| - |z_2| \quad (05) \quad (05)$$

$$\text{එනම්, } |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad [10]$$

$$|z| - |i| \leq |z - i| < \frac{1}{2} \Rightarrow |z| - 1 < \frac{1}{2} \Rightarrow |z| < \frac{3}{2} \quad (05) \quad (05)$$


$$|i| - |z| \leq |i - z| = |z - i| < \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - |z| < \frac{1}{2} \Rightarrow |z| > \frac{1}{2}. \quad (05) \quad (05)$$

$$\text{එනම්, } \frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}. \quad [20]$$




[30]

13 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 75.8%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 67%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 25%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 6%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 2%ක් පමණ ද,
 ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 10ක් ඇති අතර (b)හි තුන්වන අනුකොටසෙහි පහසුතාව ශුන්‍ය වීම කැපී පෙනේ. (a) හි හතරවන අනුකොටසෙහිත් (b) හි තුන්වන, හතරවන, පස්වන හා හයවන අනුකොටස්වලත් පහසුතා 30% ඉක්මවා නොමැත. එහෙත් (a) හි පළමුවන හා තුන්වන අනුකොටස්වලද (b) හි පළමුවන අනුකොටසෙහි ද පහසුතා 80% ඉක්මවා ඇත. (b)හි තුන්වන අනුකොටසෙහි පහසුතාව 0% වීම මගින් දැක්වෙනුයේ කිසිවකුට එම කොටස සඳහා ලකුණු ලැබීමට නොහැකි වී ඇති බවයි.

(13) (a) පළමුවන කොටස සඳහා සපයා ඇති පිළිතුරු ඉතා සාර්ථක ය. බොහෝ අපේක්ෂකයන්ට පූර්වයෙන් ලබාගත් සම්බන්ධතාව භාවිත කර **A** හි ප්‍රතිලෝමය ලබා ගැනීම අපහසු වී ඇත. මුල් ප්‍රතිඵලය යොදා ගෙන **C** න්‍යාසය සොයා ගැනීම ද සාර්ථකව කර නොතිබිණි. **BA = B** යන්න **BA - B = 0**, එනම් **B(A - I) = 0** ලෙස ලියා, එය **BC = 0** ආකාරයට පරිවර්තනය කර ගැනීමට යොමු නොවීම ඊට හේතුවයි. මෙම හේතු නිසා ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 26% දක්වා අඩුවී ඇති අතර මෙම කොටස යටතේ ඇති අනුකොටස් අතුරෙන් පහසුතාව අඩුම අනුකොටස ද මෙය වේ.

(b) සංකීර්ණ සංඛ්‍යා පිළිබඳව සිසුන්ගේ විජීය දැනුම ඉතාම පහළ මට්ටමක ඇත. පථ සහ විස්තාරය පිළිබඳ දැනුම ද ප්‍රමාණවත් නොමැත. මේ නිසා මෙම ප්‍රශ්නයෙහි මුල්ම කොටස හැරුණු විට ඉතිරි කොටස් සඳහා සිසුන් ලකුණු ලබා ඇත්තේ ඉතා අල්ප වශයෙනි. පිළිතුර සැපයීම ආරම්භයේදී ලබාගත්, පහසුතා පිළිවෙලින් 81% හා 45% වූ ප්‍රතිඵල භාවිත කර $|Z_1| - |Z_2| \leq |Z_1 - Z_2|$ බව පෙන්වීම මුළුමනින්ම අසාර්ථක වී ඇති බව පෙනේ. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය තුළ ද “සංකීර්ණ සංඛ්‍යා” ඒකකය වැඩි අවධානයක් යොමු නොවන විෂය කොටසක් බව පෙනේ. සංකීර්ණ සංඛ්‍යා ආශ්‍රිතව අසමානතා හැසිරවීම පිළිබඳ සිසුන්ගේ නොහැකියාව ද වඩාත් කැපී පෙනේ. සංයුක්ත ගණිතය **I** ප්‍රශ්න පත්‍රයේ **B** කොටසෙහි ප්‍රශ්න අතුරෙන්, එක් එක් ප්‍රශ්නයට හිමි මුළු ලකුණුවලින් 0 - 25% ප්‍රාන්තරයේ ලකුණු වැඩියෙන්ම ලබා ඇති ප්‍රශ්නය මෙයයි. එසේම, ප්‍රශ්නයට හිමි ලකුණුවලින් 75 - 100% ප්‍රාන්තරයේ ලකුණු අඩුවෙන්ම ලබා ඇති ප්‍රශ්නය ද මෙයයි.

න්‍යාසවල මූලික ගුණ සහ සරල විජීය ප්‍රකාශන හැසිරවීම ද සංකීර්ණ සංඛ්‍යා පිළිබඳ මූලික දැනුම සහ ආර්ගන්ඩ් සටහන ද සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවල විජීය අසමානතා සහ විජීය ප්‍රකාශන සුළු කිරීම පිළිබඳ දැනුම ද ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතිණි. එබැවින් පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම ප්‍රශ්නය තෝරා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන සිසුන් වෙතොත් ඔවුන් විසින් සංකීර්ණ සංඛ්‍යා පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය වන අභ්‍යාසවල යෙදීමත් අදාළ පොත්පත් පරිශීලනය කර සංකල්ප මනාව සාධනය කර ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය වේ.

14 වන ප්‍රශ්නය

14.(a) පළමු ව්‍යුත්පන්නය පමණක් සලකමින් $\frac{x^3}{x^4+27}$ හි අවම හා උපරිම අගයන් සොයන්න.

$$y = \frac{x^3}{x^4+27} \text{ හි ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහනක් අඳින්න.}$$

ඒ නමින්, k හි කවර අගයන් සඳහා $kx^4 - x^3 + 27k = 0$ සමීකරණයට

(i) තාත්ත්වික සමපාත මූල දෙකක් තිබේ දැයි,

(ii) තාත්ත්වික සමපාත මූල තුනක් තිබේ දැයි,

(iii) තාත්ත්වික ප්‍රතිත්ත මූල දෙකක් තිබේ දැයි,

(iv) තාත්ත්වික මූල තෝනිබේ දැයි

සොයන්න; මෙහි k තාත්ත්වික වෙයි.

(b) $AB = a$ හා $BC = b$ ($< a$) සහිත $ABCD$ සෘජුකෝණාස්‍රයක් සලකමු. P යනු CD මත විචලනය විය හැකි ලක්ෂ්‍යයක් යැයි ගනිමු. $AP + PB$ හි දිග $L(x)$ වෙයි; මෙහි $DP = x$ වෙයි.

$$L(x) = \sqrt{x^2 + b^2} + \sqrt{(a-x)^2 + b^2} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$L(x)$ හි අවම දිග හා මෙම අවම දිගට අනුරූප P හි පිහිටුම CD මත සොයන්න.

$L(x)$ හි උපරිම දිග ද සොයන්න.

(a) $f(x) = \frac{x^3}{x^4+27}$ යැයි ගනිමු.

$$\text{එවිට, } f'(x) = \frac{3x^2(x^4+27) - x^3(4x^3)}{(x^4+27)^2} = \frac{x^2(81-x^4)}{(x^4+27)^2} = 0 \Rightarrow x = -3, 0, 3 \text{ වේ.}$$

(05)

(05)

(05)

x හි පරාසය	$(-\infty, -3)$	$(-3, 0)$	$(0, 3)$	$(3, \infty)$
$f'(x)$	-	+	+	-

(05)

(05)

එබැවින්, $f(x)$ ට $x = -3$ හිදී අවමයක් හා $x = 3$ හිදී උපරිමයක් තිබෙයි. (05)

$$f(-3) = \frac{(-3)^3}{(-3)^4+27} = -\frac{1}{4} \text{ හා } f(3) = \frac{(3)^3}{(3)^4+27} = \frac{1}{4} \text{ වේ.}$$


(05)

(05)

එබැවින්, $f(x)$ හි අවම අගය හා උපරිම අගය පිළිවෙළින් $-\frac{1}{4}$ හා $\frac{1}{4}$ වේ.

[40]

$x \rightarrow \pm \infty$ වන විට $f(x) \rightarrow \pm 0$



$y = k$ හා $y = \frac{x^3}{x^4 + 27}$ සලකමු.

$y = k$ හා $y = \frac{x^3}{x^4 + 27}$ හි ඡේදන ලක්ෂ්‍යවල පාවිච්ඡා යනු $kx^4 - x^3 + 27k = 0$ සමීකරණයේ

විසඳුම් වේ. (05)

එබැවින්,

(i) $k = -\frac{1}{4}$ හෝ $\frac{1}{4}$ විට, $y = k$ රේඛාව $y = \frac{x^3}{x^4 + 27}$ චක්‍රය ස්පර්ශ කරන අතර, ඒ නයින්

$kx^4 - x^3 + 27k = 0$ ට තාත්ත්වික සමපාත මූල දෙකක් තිබෙයි. (05)

(ii) $k = 0$ විට $y = k$ රේඛාව $y = \frac{x^3}{x^4 + 27}$ චක්‍රය ඔස්සේ යන අතර ඒ නයින්

$kx^4 - x^3 + 27k = 0$ සමීකරණය $x^3 = 0$ ට උභයනය වන අතර එයට තාත්ත්වික

සමපාත මූල තුනක් තිබෙයි. (05)

(iii) $-\frac{1}{4} < k < 0$ හෝ $0 < k < \frac{1}{4}$ විට, $y = k$ රේඛාව $y = \frac{x^3}{x^4 + 27}$ චක්‍රය ප්‍රහින්ත ලක්ෂ්‍ය

දෙකක දී කපන අතර ඒ නයින් $kx^4 - x^3 + 27k = 0$ ට තාත්ත්වික ප්‍රහින්ත මූල දෙකක් තිබෙයි. (05)

(iv) $k < -\frac{1}{4}$ හෝ $k > \frac{1}{4}$ විට, $y = k$ රේඛාව $y = \frac{x^3}{x^4 + 27}$ චක්‍රය නොකපන අතර ඒ


නයින් $kx^4 - x^3 + 27k = 0$ ට තාත්ත්වික මූල නොමැත. (05)

[30]

(b) $L(x) = AP + PB$ (05)

$$= \sqrt{AE^2 + EP^2} + \sqrt{BE^2 + EP^2}$$

$$= \sqrt{x^2 + b^2} + \sqrt{(a-x)^2 + b^2} \quad (05)$$



[10]

$$\frac{dL(x)}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + b^2}} - \frac{a-x}{\sqrt{(a-x)^2 + b^2}} \quad (05)$$

$$= \frac{x\sqrt{(a-x)^2 + b^2} - (a-x)\sqrt{x^2 + b^2}}{\sqrt{x^2 + b^2}\sqrt{(a-x)^2 + b^2}}$$

$$= 0 \Rightarrow x\sqrt{(a-x)^2 + b^2} - (a-x)\sqrt{x^2 + b^2} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 \{(a-x)^2 + b^2\} = (a-x)^2 \{x^2 + b^2\} \Rightarrow x^2 = (a-x)^2 \Rightarrow x = \frac{a}{2}. \quad (05)$$

x හි පරාසය	$0 \leq x < \frac{a}{2}$	$x = \frac{a}{2}$	$\frac{a}{2} < x \leq a$
$L'(x)$	-	0	+

(05)

$x = \frac{a}{2}$ විට, $L(x)$ අවම වේ. (05)

$$\text{අවම දිග} = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + b^2} + \sqrt{\left(a - \frac{a}{2}\right)^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + 4b^2} \quad (05)$$

මෙය වන්නේ P ලක්ෂ්‍යය CD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන විට ය. (05)


[35]

P ලක්ෂ්‍යය D හි හෝ C හි පිහිටන විට $L(x)$ උපරිම වන අතර මෙම අවස්ථාවේදී

$$L(x) = b + \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$


[05]

14 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 67.7%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 56%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 22%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 16%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 6%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 9ක් ඇති අතර ඒවා අතුරෙන් පහසුතාව 50% ට නොඅඩු වන්නේ අනුකොටස් තුනක පමණි. එමෙන්ම (a) (ii), (iii) හා (iv) අනුකොටස්වල පහසුතාව 20%ටත් වඩා අඩුවේ. (b)හි පළමුවන අනුකොටසෙහි පහසුතාව උපරිම වන අතර එය 85%කි. අවම පහසුතාව ඇත්තේ (a)(ii) අනුකොටසට වන අතර එහි පහසුතාව 14%ක් පමණි.

(14) (a) සංඛ්‍යා බෙදීමේදී භාජකය නිශ්ශුන්‍ය විය යුතු බව නොසැලකීම හේතුවෙන් අපේක්ෂකයන් වැඩි දෙනෙක් $x \neq 0$ ලෙස ගෙන ඇති නිසා හෝ $x = 0$ අවස්ථාව නොසලකා හැර ඇති නිසා, එක් ස්ථාවර ලක්ෂ්‍යයක් සැලකිල්ලට ගෙන නොමැති බැවින් නතිවර්තන ලක්ෂ්‍යය ලබා ගෙන නොමැත. (ii), (iii), (iv) කොටස්වල බොහෝ පිළිතුරු ද නිවැරදිව හා පරිපූර්ණව ප්‍රකාශ කර නොතිබිණි. (ii) කොටසෙහි තාත්ත්වික සමපාත මූල තුනක් පිළිබඳ අවබෝධයක් ද තිබී නොමැත. දී ඇති ශ්‍රිතයෙහි ජ්‍යාමිතික නිරූපණය පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් නොමැති වීම ද මෙම කොටසට ලකුණු අහිමි වීමට හේතු විය.

(b) $L(x)$ නිවැරදිව ප්‍රකාශ කර තිබූ නමුත් අවකලනය කළ පසු ලැබී ඇති ප්‍රකාශනය සංකීර්ණ බැවින් ස්ථාවර අගය නිවැරදිව ලබා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. $L(x)$ හි උපරිම අගය සෙවීමට ප්‍රමාණවත් තර්කන හැකියාවක් ද තිබී නොමැත.

I පත්‍රයෙහි B කොටසෙහි ප්‍රශ්න අතුරින්, සිසුන් අඩුවෙන්ම තෝරා ගෙන ඇති ප්‍රශ්නය මෙයයි. සිසුනට මෙම ප්‍රශ්නයේ (a) කොටසේ (ii), (iii), (iv) අනුකොටස් වඩාත් දුෂ්කර වී ඇත. මේ හේතුව නිසා මෙම කොටසෙහි පහසුතාව ඉතා පහළ මට්ටමකට සීමා වී ඇත.

විජීය ශ්‍රිතය සහ ප්‍රස්තාරය අතර ඇති සම්බන්ධතාව ගොඩ නගා ගැනීමට බොහෝ සිසුනට අපහසු වී ඇත. අවකලනය භාවිත කර ප්‍රස්තාරයක විවිධ ලක්ෂණ හඳුනාගැනීම පිළිබඳ දැනුම සතුටුදායක නොවන බව පෙනේ. ශ්‍රිතයන් එහි අවකලන සංගුණකත් සුදුසු පරිදි භාවිත කරමින් ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරයෙහි සන්නික බව, ස්පර්ශෝන්මුඛ (ඇත්නම්) හා ස්ථාවර ලක්ෂ්‍ය හඳුනාගැනීමේ කුසලතාවත්, x හි එක් ප්‍රාන්තරයක් තුළ ශ්‍රිතයෙහි හැසිරීම භාවිත කර අනුයාත ප්‍රාන්තරයක් තුළ ශ්‍රිතයෙහි හැසිරීම නිර්ණය කළ හැකිවීමේ කුසලතාවත් නිදසුන් ඇසුරෙන් වර්ධනය කරගනු ලැබීම අවශ්‍ය වේ. චක්‍රවල දළ සටහන් සුමටව ඇඳීමේ හැකියාව හා දී ඇති ශ්‍රිතයක ජ්‍යාමිතික නිරූපණය පිළිබඳ අවබෝධය ද වැඩි දියුණු කළ යුතුය.

15 වන ප්‍රශ්නය

15. (a) $\int_0^{\pi} (\sin^3 x - \cos^3 x) dx = \frac{4}{3}$ බව පෙන්වන්න.

(b) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය යොදාගනිමින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් හෝ, $\int x^3 \tan^{-1} x dx$ සොයන්න.

(c) හින්න භාග යොදාගනිමින් $\int \frac{2x^2 - 3}{(x-2)^2 (x^2 + 1)} dx$ සොයන්න.

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \int_0^{\pi} (\sin^3 x - \cos^3 x) dx &= \int_0^{\pi} \left\{ (1 - \cos^2 x) \sin x - (1 - \sin^2 x) \cos x \right\} dx \quad (05) \\
 &= \left[\underbrace{-\cos x}_{(05)} + \underbrace{\frac{\cos^3 x}{3}}_{(05)} - \underbrace{\sin x}_{(05)} + \underbrace{\frac{\sin^3 x}{3}}_{(05)} \right]_0^{\pi} = \underbrace{2 - \frac{2}{3}}_{(05)} = \frac{4}{3} \quad [30]
 \end{aligned}$$

වෙනත් ක්‍රමයක් :

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \int_0^{\pi} (\sin^3 x - \cos^3 x) dx &= \int_0^{\pi} (\sin x - \cos x) (\sin^2 x + \sin x \cos x + \cos^2 x) dx \\
 &= \int_0^{\pi} (\sin x - \cos x) (1 + \sin x \cos x) dx \\
 &= \int_0^{\pi} (\sin x + \sin^2 x \cos x - \cos x - \cos^2 x \sin x) dx \quad (05) \\
 &= \left[\underbrace{-\cos x}_{(05)} + \underbrace{\frac{\sin^3 x}{3}}_{(05)} - \underbrace{\sin x}_{(05)} + \underbrace{\frac{\cos^3 x}{3}}_{(05)} \right]_0^{\pi} = \underbrace{2 - \frac{2}{3}}_{(05)} = \frac{4}{3} \quad [30]
 \end{aligned}$$

$$(b) \int x^3 \tan^{-1} x dx = \frac{x^4}{4} \tan^{-1} x - \frac{1}{4} \int \frac{x^4}{1+x^2} dx \quad (05) \quad (05)$$

$$= \frac{x^4}{4} \tan^{-1} x - \frac{1}{4} \int \frac{(x^2+1)^2 - (2x^2+1)}{1+x^2} dx \quad (10)$$

$$= \frac{x^4}{4} \tan^{-1} x - \frac{1}{4} \int (x^2+1) dx + \frac{1}{4} \int \frac{2(x^2+1)-1}{1+x^2} dx \quad (10)$$

$$= \frac{x^4}{4} \tan^{-1} x - \frac{1}{4} \left(\frac{x^3}{3} + x \right) + \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1+x^2} \quad (05) \quad (05)$$

$$= \frac{x^4}{4} \tan^{-1} x - \frac{1}{4} \left(\frac{x^3}{3} + x \right) + \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \tan^{-1} x + C; \text{ මෙහි } C \text{ යනු අභිමත නියතයකි.} \quad (10)$$

[50]

$$(c) \frac{2x^2-3}{(x-2)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}; \text{ මෙහි } A, B, C \text{ හා } D \text{ යනු නිර්ණය කළ යුතු}$$

$$\text{නියත වේ.} \quad (05) \quad (05) \quad (05)$$

$$2x^2-3 \equiv A(x-2)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x-2)^2$$

$$x=2 \text{ ගැනීමෙන් } B=1 \text{ ලැබෙයි.} \quad (05)$$

$$\text{නියත පද සැසඳීමෙන් } -3 = -2A + B + 4D \text{ ලැබෙයි.}$$

$$x^3 \text{ පදයෙහි සංගුණක සැසඳීමෙන් } 0 = A + C \text{ ලැබෙයි.}$$

$$x \text{ පදයෙහි සංගුණක සැසඳීමෙන් } 0 = A + 4C - 4D \text{ ලැබෙයි.} \quad (10)$$

$$-3 = -2A + B + 4D \text{ හි } B=1 \text{ යැයි යෙදීමෙන් } -2 = -A + 2D \rightarrow (1) \text{ ලැබෙයි.}$$

$$0 = A + 4C - 4D \text{ හි } C = -A \text{ යැයි යෙදීමෙන් } 0 = 3A + 4D \rightarrow (2) \text{ ලැබෙයි.}$$

$$(1) \text{ හා } (2) \text{ න් } D = -\frac{3}{5} \text{ හා } A = \frac{4}{5} \text{ යැයි ලැබෙයි.} \quad (05) \quad (05)$$

$$C = -\frac{4}{5} \quad (05)$$

$$\frac{2x^2 - 3}{(x-2)^2(x^2+1)} = \frac{4}{5(x-2)} + \frac{1}{(x-2)^2} - \frac{4x+3}{5(x^2+1)}$$

$$\int \frac{2x^2 - 3}{(x-2)^2(x^2+1)} dx = \frac{4}{5} \int \frac{dx}{(x-2)} + \int \frac{dx}{(x-2)^2} - \frac{1}{5} \int \frac{4x+3}{(x^2+1)} dx \quad (05)$$


$$= \frac{4}{5} \ln|x-2| - \frac{1}{(x-2)} - \frac{2}{5} \int \frac{2x}{(x^2+1)} dx - \frac{3}{5} \int \frac{dx}{(x^2+1)}$$

(05) (05)

$$= \frac{4}{5} \ln|x-2| - \frac{1}{(x-2)} - \frac{2}{5} \ln(x^2+1) - \frac{3}{5} \tan^{-1} x + K ; \text{ මෙහි } K \text{ යනු}$$


(10) අභිමත නියතයකි. [70]

15 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 93.5%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 35%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 25%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 22%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 18%ක් පමණ ද,
 ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි කොටස් 3ක් ඇති අතර (b) කොටස හැර අන් කොටස් දෙකෙහිම පහසුතාව 50%ට අඩු නොවේ. (a) කොටසෙහි පහසුතාව උපරිම වන අතර එය 54%කි. අවම පහසුතාව ඇත්තේ (b) කොටසට වන අතර එහි පහසුතාව 48%කි. (a), (b) හා (c) යන කොටස් තුනෙහිම පහසුතාව 48% - 54% ප්‍රාන්තරයට සීමා වී තිබීම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයකි.

(15) (a) පිළිතුරු සැපයීමේදී සිසුන් සරල හා කෙටි ක්‍රම වෙනුවට දීර්ඝ ක්‍රම භාවිත කිරීමට පෙළඹී තිබුණි. පැහැදිලිව පෙනෙන සහ දෙකක අන්තරයක සාධක ලෙස, දී ඇති අනුකලය සකස් කරනු ලැබුවේ නම්, වඩා පහසුවෙන් නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගත හැකිව තිබිණි.

(b) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කිරීමේ ක්‍රමය සහ අනතුරුව අවශ්‍ය වන විෂම පරිමේය ශ්‍රිත අනුකලනය කිරීමේ ශිල්පක්‍රම නිවැරදිව භාවිත කර නැත.

(c) දී ඇති පරිමේය ශ්‍රිතයක් අනුකලනය කළ හැකි ආකාරයේ නියම පරිමේය ශ්‍රිතවල සංයෝජනයක් ලෙස දැක්වීමෙන්, විෂය ප්‍රකාශන සුළු කර හින්න භාගවල නියතවල අගය නිවැරදිව ලබා ගැනීමෙන් හැකියාව සිසුන් තුළ වර්ධනය වී නොතිබීම හේතුවෙන් මෙම කොටසට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. මෙම දුර්වලතා හේතුවෙන් ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව තරමක් අඩු මට්ටමක පැවතිණි.

විෂය ප්‍රකාශන සුළු කිරීමේ දුර්වලතා වෙසෙසින් දක්නට ලැබිණි. අ.පො.ස.(සා.පෙළ) මට්ටමේදී ඒ පිළිබඳව ලබා ගත් දැනුම සංකීර්ණ අභ්‍යාසවලදී නිවැරදිව භාවිත කිරීමේ හැකියාව ප්‍රමාණවත් නොවීම හා එම දැනුම වුව ද යාවත්කාලීන නොකර ගැනීම මෙවැනි ප්‍රශ්නවලට නිවැරදිව පිළිතුරු සැපයීමේ පහසුතාව හීන කෙරෙන බැවින්, එම හැකියා වර්ධනය කෙරෙන අභ්‍යාසවල සිසුන් නිරත කරවීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් වේ.

16 වන ප්‍රශ්නය

16.(a) සමාන්තර නොවන $l_1 \equiv a_1x + b_1y + c_1 = 0$ හා $l_2 \equiv a_2x + b_2y + c_2 = 0$ යන සරල රේඛා අතර කෝණ සම්විච්ඡේදකවල සමීකරණ සොයන්න.

$2x - 11y - 10 = 0$ හා $10x + 5y - 2 = 0$ මගින් දෙනු ලබන සරල රේඛා දෙක අතර සුළු කෝණයේ සම්විච්ඡේදකය, $4x - 7y - 8 = 0$ හා $8x + y - 4 = 0$ මගින් දෙනු ලබන සරල රේඛා දෙක අතර මහා කෝණයේ සම්විච්ඡේදකය ම බව පෙන්වන්න.

(b) g හා f හි සියලු අගයන් සඳහා $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - r^2 = 0$ වෘත්තය $x^2 + y^2 - r^2 = 0$ වෘත්තයේ පරිධිය සම්විච්ඡේදනය කරන බව පෙන්වන්න.

$y + 5 = 0$ සරල රේඛාව ස්පර්ශ කරමින් හා $x^2 + y^2 - 4 = 0$ වෘත්තයේ පරිධිය සම්විච්ඡේදනය කරමින් $(1, 1)$ ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ වෘත්ත දෙකක් ඇඳිය හැකි බව පෙන්වන්න.

මෙම වෘත්ත දෙකෙහි සමීකරණ සොයන්න.

(a) $P_0(x_0, y_0)$ යනු රේඛා දෙකෙහි සිට එකම දුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක් යැයි ගනිමු.

P_0 ලක්ෂ්‍යයේ සිට $l_1 = 0$ හා $l_2 = 0$ රේඛාවලට ඇති ලම්බ දුර පිළිවෙළින්

$$\frac{|a_1x_0 + b_1y_0 + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \quad \text{හා} \quad \frac{|a_2x_0 + b_2y_0 + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}} \quad \text{වේ.}$$

(05) (05)

මෙම දුරවල් එකම බැවින්

$$\frac{|a_1x_0 + b_1y_0 + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|a_2x_0 + b_2y_0 + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}} \quad \text{ලැබෙයි.}$$

(05)

n හා m සංඛ්‍යා දෙකක නිරපේක්ෂ අගයන් සමාන නම් එවිට, $n = m$ හෝ $n = -m$ වේ.

ඉහත කරුණ යෙදීමෙන් $\frac{a_1x_0 + b_1y_0 + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x_0 + b_2y_0 + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$ ලැබෙයි.

එබැවින් $l_1 = 0$ හා $l_2 = 0$ රේඛාවලට සමදුරින් පිහිටි ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක ඛණ්ඩාංක

$$\frac{a_1x_0 + b_1y_0 + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x_0 + b_2y_0 + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}} \quad \text{සමීකරණ සපුරාලයි.} \quad (05)$$

$l_1 = 0$ හා $l_2 = 0$ රේඛාවලට සමදුරින් පිහිටන සේ $P(x, y)$ ලක්ෂ්‍යයක් විචල්‍යය වේ

නම් එවිට, P යනු $l_1 = 0$ හා $l_2 = 0$ රේඛාවල කෝණ සමච්ඡේදක මත පිහිටි විචල්‍ය ලක්ෂ්‍යයකි.

එබැවින්, කෝණ සමච්ඡේදකවල සමීකරණ

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}} \quad \text{වේ.} \quad (05) \quad [25]$$

$2x - 11y - 10 = 0$ හා $10x + 5y - 2 = 0$ රේඛාවල කෝණ සමච්ඡේදකවල සමීකරණ

$$\frac{2x - 11y - 10}{\sqrt{2^2 + (-11)^2}} = \pm \frac{10x + 5y - 2}{\sqrt{10^2 + 5^2}} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$\begin{aligned} \text{එනම්, } 2x - 11y - 10 = \pm(10x + 5y - 2) &\Rightarrow x + 2y + 1 = 0 \quad \text{හෝ} \quad 2x - y - 2 = 0 \quad \text{වේ.} \\ &\quad (05) \qquad \qquad \qquad (05) \end{aligned}$$

θ යනු $2x - 11y - 10 = 0$ හා $x + 2y + 1 = 0$ රේඛා අතර කෝණය යැයි ගනිමු.

$$\tan \theta = \left| \frac{\frac{2}{11} - \left(-\frac{1}{2}\right)}{1 + \left(\frac{2}{11}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)} \right| = \frac{3}{4} < 1 \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

එබැවින්, $2x - 11y - 10 = 0$ හා $10x + 5y - 2 = 0$ මගින් දෙනු ලබන සරල රේඛා දෙක

අතර සුළු කෝණයේ සමච්ඡේදකය $x + 2y + 1 = 0$ වේ. (05)

$4x - 7y - 8 = 0$ හා $8x + y - 4 = 0$ රේඛාවල කෝණ සමච්ඡේදකවල සමීකරණ

$$\frac{4x - 7y - 8}{\sqrt{4^2 + (-7)^2}} = \pm \frac{8x + y - 4}{\sqrt{8^2 + 1^2}} \text{ වේ. (05)}$$

$$\text{එනම්, } 4x - 7y - 8 = \pm(8x + y - 4) \Rightarrow x + 2y + 1 = 0 \text{ හෝ } 2x - y - 2 = 0 \text{ වේ.}$$

(05) (05)

ϕ යනු $4x - 7y - 8 = 0$ හා $x + 2y + 1 = 0$ රේඛා අතර කෝණය යැයි ගනිමු.

$$\text{එවිට, } \tan \phi = \left| \frac{\frac{4}{7} - \left(-\frac{1}{2}\right)}{1 + \left(\frac{4}{7}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)} \right| = \frac{3}{2} > 1 \text{ වේ. (05)}$$

එබැවින්, $4x - 7y - 8 = 0$ හා $8x + y - 4 = 0$ මගින් දෙනු ලබන සරල රේඛා දෙක අතර

$$\text{මහා කෝණයේ සමච්ඡේදකය } x + 2y + 1 = 0 \text{ වේ. (05) [50]}$$

(b) $P_0(x_0, y_0)$ යනු $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - r^2 = 0$ හා $x^2 + y^2 - r^2 = 0$ වෘත්ත දෙකෙහි
 ඡේදන ලක්ෂ්‍යයක් යැයි ගනිමු.

$$\text{එවිට, } x_0^2 + y_0^2 + 2gx_0 + 2fy_0 - r^2 = 0 \rightarrow (1) \text{ හා } x_0^2 + y_0^2 - r^2 = 0 \rightarrow (2) \text{ යැයි ලැබේ.}$$

$$(1) - (2) \Rightarrow 2gx_0 + 2fy_0 = 0 \Rightarrow gx_0 + fy_0 = 0 \text{ වේ. (05)}$$

එබැවින්, ඡේදන ලක්ෂ්‍ය $gx + fy = 0$ රේඛාව මත පිහිටයි. (05)

මෙම රේඛාව මූල ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන බැවින් හා $x^2 + y^2 - r^2 = 0$ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය

මූල ලක්ෂ්‍යය බැවින් g හා f හි සියලු අගයන් සඳහා $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - r^2 = 0$ වෘත්තය

$$x^2 + y^2 - r^2 = 0 \text{ වෘත්තයේ පරිධිය සමච්ඡේදනය කරයි. (05) [15]}$$

$$g \text{ හා } f \text{ හි සියලු අගයන් සඳහා } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - 4 = 0 \text{ වෘත්තය } x^2 + y^2 - 4 = 0$$

(05)

වෘත්තයේ පරිධිය සමච්ඡේදනය කරයි.

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - 4 = 0 \text{ වෘත්තයේ අරය } \sqrt{g^2 + f^2 + 4} \text{ වේ. (05)}$$

$$(-g, -f) \text{ කේන්ද්‍රයේ සිට } y + 5 = 0 \text{ රේඛාවට දුර } |-f + 5| \text{ වේ. (05)}$$

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - 4 = 0 \text{ වෘත්තය } y + 5 = 0 \text{ රේඛාව ස්පර්ශ කරන බැවින්}$$

$$\sqrt{g^2 + f^2 + 4} = |-f + 5| \Rightarrow g^2 + f^2 + 4 = f^2 - 10f + 25 \Rightarrow g^2 + 10f - 21 = 0 \rightarrow (1)$$

(05)

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - 4 = 0$ වෘත්තය $(1, 1)$ ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යයි නම්

$$1 + 1 + 2g + 2f - 4 = 0 \Rightarrow g + f = 1 \text{ යැයි ලැබෙයි. (05)}$$

$g + f = 1$ යැයි (1) හි ආදේශයෙන්

$$g^2 - 10g - 11 = 0 \Rightarrow (g - 11)(g + 1) = 0 \Rightarrow g = 11 \text{ හෝ } -1 \text{ වේ.}$$

(05)

(05)

$$g = 11 \text{ විට } f = -10 \text{ වේ. (05)}$$

$$g = -1 \text{ විට } f = 2 \text{ වේ. (05)}$$

g හා f සඳහා අගය කුලක දෙකක් ඇති බැවින් වෘත්ත දෙකක් පවතී. (05)

[50]

වෘත්ත දෙකෙහි සමීකරණ


$$x^2 + y^2 + 22x - 20y - 4 = 0 \text{ හා } x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0 \text{ වේ.}$$

(05)

(05)


[10]

16 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 69.2%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 43%ක් පමණ ද,
ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 33%ක් පමණ ද,
ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 14%ක් පමණ ද,
ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 10%ක් පමණ ද,
ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 5ක් ඇති අතර (b)හි දෙවන අනුකොටසෙහි හැර අනෙක් සියලුම අනුකොටස්වල පහසුතාව 30%ට වඩා අඩු නොවේ. එම අනුකොටසෙහි පහසුතාව 29%කි. (a)හි පළමුවන අනුකොටසෙහි පහසුතාව උපරිම වන අතර එය 70%කි.

(16) (a) කෝණ සමවිෂේදකවල සමීකරණ ලිවීමේදී සාධාරණ සමීකරණය ලියා නොතිබූ අතර සුළු කෝණ සමවිෂේදකය හා මහා කෝණ සමවිෂේදකය වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව ද ප්‍රමාණවත්ව නොතිබුණි.

(b) පොදු ලක්ෂ්‍යය නොසලකා සෘජුවම අදාළ සමීකරණය ලබා ගෙන ඇත. බොහෝ අපේක්ෂකයින් දීර්ඝ ක්‍රම භාවිතයෙන් මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර තිබුණි.

මෙම ප්‍රශ්නයෙහි කොටස් දෙකෙහිදී ම මුලින් දී ඇති සිද්ධාන්ත කොටස් ඊට පසුව දී ඇති අභ්‍යාසයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ නම් වඩාත් පහසුවෙන් පිළිතුරු කරා ළඟා විය හැකිව තිබිණි. එහෙත් බොහෝ සිසුන් දීර්ඝ ක්‍රම භාවිතයෙන් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර තිබූ අතර එමඟින් අවසාන පිළිතුරට ළඟාවීමට බලපෑ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව පහළ මට්ටමක පැවතිණි.

බණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතියෙහිදී සාධාරණ සමීකරණ ලබා ගැනීම වැනි මූලික සිද්ධාන්ත හා විෂය කරුණු පිළිබඳ දැනුම හා එම දැනුම භාවිත කිරීමේ හැකියාව ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින්, එම දැනුම හා හැකියා වර්ධනය වන පරිදි ඉගෙනුම් අත්දැකීම් සිසුනට ලබා දිය යුතු වේ.

17 වන ප්‍රශ්නය

17.(a) ABC ත්‍රිකෝණයක් සඳහා සුපුරුදු අංකනයෙන්,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ බව සාධනය කරන්න.}$$

$$a = (b - c) \cos \frac{A}{2} \operatorname{cosec} \frac{B - C}{2} \text{ බව අපෝහනය කරන්න.}$$


(b) θ හි ඕනෑම තාත්ත්වික අගයක් සඳහා $\tan \theta - 2 \tan \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)$ ප්‍රකාශනයට -7 හා 1 අතර කිසිම අගයක් ගත නොහැකි බව පෙන්වන්න.

(c) $5 \cos^2 \theta + 18 \cos \theta \sin \theta + 29 \sin^2 \theta$ යන්න, $a + b \cos(2\theta + \alpha)$ ආකාරයට ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි a හා b යනු නියත වන අතර α යනු θ වලින් ස්වායත්ත කෝණයක් වෙයි.


ඒ නයින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් හෝ,

$$8(\cos x + \sin x)^2 + 2(\cos x + 5 \sin x)^2 = 19 \text{ සමීකරණයේ සාධාරණ විසඳුම යොයන්න.}$$


(a)



(i) ABC සුළු කෝණී ත්‍රිකෝණයකි.



(ii) ABC සෘජු කෝණී ත්‍රිකෝණයකි.



(iii) ABC මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයකි.

$$AD = AB \sin B = AC \sin C, \quad AD = AB \sin B = AC \sin C, \quad AD = AB \sin(\pi - B) = AC \sin C$$

$$\therefore \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}, \quad (05) \quad \therefore \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}, \quad (05) \quad \therefore \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad (05)$$

$$\text{මෙලෙසම } \frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ බව පෙන්විය හැකිය. (05)}$$

$$\therefore \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad [20]$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b-c}{\sin B - \sin C} \quad (05)$$

$$\frac{a}{2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}} = \frac{b-c}{2 \cos \left(\frac{B+C}{2} \right) \sin \left(\frac{B-C}{2} \right)} = \frac{b-c}{2 \sin \left(\frac{A}{2} \right) \sin \left(\frac{B-C}{2} \right)} \quad (05)$$

$$a = (b-c) \cos \frac{A}{2} \operatorname{cosec} \frac{B-C}{2} \quad (05) \quad [25]$$

(b) $k = \tan \theta - 2 \tan \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)$ යැයි ගනිමු.

$$= \tan \theta - 2 \frac{\tan \theta - 1}{1 + \tan \theta} = \frac{\tan^2 \theta - \tan \theta + 2}{1 + \tan \theta} \quad (05)$$

$$\text{එනම්, } \tan^2 \theta - (k+1) \tan \theta + 2 - k = 0 \text{ වේ. (05)}$$

$$(k+1)^2 - 4(2-k) \geq 0 \text{ ම නම් පමණක් මෙම සමීකරණයට තාත්ත්වික විසඳුම් තිබෙයි. (05)}$$

$$\text{එනම්, } k^2 + 6k - 7 \geq 0 \text{ ම නම් පමණක් (05)}$$

$$\text{එනම්, } (k+7)(k-1) \geq 0 \text{ ම නම් පමණක් (05)}$$

$$\text{එනම්, } k \leq -7 \text{ හෝ } k \geq 1 \text{ ම නම් පමණක් (05)}$$

එබැවින්, θ හි ඕනෑම තාත්ත්වික අගයක් සඳහා $\tan \theta - 2 \tan \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)$ ප්‍රකාශනයට -7 හා 1

අතර කිසිම අගයක් ගත නොහැකිය.

[30]

$$(c) 5 \cos^2 \theta + 18 \cos \theta \sin \theta + 29 \sin^2 \theta$$

$$= \frac{5}{2}(1 + \cos 2\theta) + 9 \sin 2\theta + \frac{29}{2}(1 - \cos 2\theta) \quad (05)$$

$$= 17 - 12 \cos 2\theta + 9 \sin 2\theta$$

$$= 17 - 15 \left(\frac{4}{5} \cos 2\theta - \frac{3}{5} \sin 2\theta \right) \quad (05)$$

$$= 17 - 15(\cos \alpha \cos 2\theta - \sin \alpha \sin 2\theta); \text{ මෙහි } \cos \alpha = \frac{4}{5} \text{ හා } \sin \alpha = \frac{3}{5} \text{ වේ.} \quad (05)$$

$$= 17 - 15 \cos(2\theta + \alpha); \text{ මෙහි } \cos \alpha = \frac{4}{5} \text{ හා } \sin \alpha = \frac{3}{5} \text{ වේ.} \quad (05)$$

$$= a + b \cos(2\theta + \alpha); \text{ මෙහි } a = 17, b = -15 \text{ වන අතර } \cos \alpha = \frac{4}{5} \text{ හා } \sin \alpha = \frac{3}{5} \text{ වන පරිදි } \alpha \text{ වේ.} \quad [25]$$

$$8(\cos x + \sin x)^2 + 2(\cos x + 5 \sin x)^2 = 19$$

$$8(\cos^2 x + 2 \cos x \sin x + \sin^2 x) + 2(\cos^2 x + 10 \cos x \sin x + 25 \sin^2 x) = 19 \quad (05)$$

$$10 \cos^2 x + 36 \cos x \sin x + 58 \sin^2 x = 19 \quad (05)$$

$$5 \cos^2 x + 18 \cos x \sin x + 29 \sin^2 x = \frac{19}{2} \quad (05)$$

$$17 - 15 \cos(2x + \alpha) = \frac{19}{2}; \text{ මෙහි } \cos \alpha = \frac{4}{5} \text{ හා } \sin \alpha = \frac{3}{5} \text{ වන පරිදි } \alpha \text{ වේ.} \quad (05)$$

$$15 \cos(2x + \alpha) = 17 - \frac{19}{2} = \frac{15}{2} \quad (05)$$

$$\cos(2x + \alpha) = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$$


$$2x + \alpha = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3} \text{ මෙහි } n \text{ යනු නිඛිලයක් වේ.} \quad (05)$$

$$x = n\pi - \frac{\alpha}{2} \pm \frac{\pi}{6}; \text{ මෙහි } n \text{ යනු නිඛිලයක් වන අතර } \cos \alpha = \frac{4}{5} \text{ හා } \sin \alpha = \frac{3}{5}$$

$$\text{වන පරිදි } \alpha \text{ වේ.} \quad (05)$$


[50]

17 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 84.9%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 53%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 25%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 12%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 10%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි කොටස් / අනුකොටස් 4ක් ඇති අතර (b) කොටස හැර අන් සියලු කොටස්වල / අනුකොටස්වල පහසුතාව 30%ට වඩා වැඩිවේ. එම (b) කොටසට 29%ක පහසුතාවක් ඇත. (a) හි පළමුවන අනුකොටසෙහි පහසුතාව උපරිම වන අතර එය 69%කි.

- (17) (a) බොහෝ සිසුන් සුළුකෝණී, සෘජුකෝණී හා මහාකෝණී ත්‍රිකෝණ ඇඳ තිබුණ ද එම ත්‍රිකෝණවල සෘජුකෝණය හෝ මහාකෝණය නොසලකා සුළුකෝණ පමණක් සලකා sin සූත්‍රය සාධනය කර තිබුණි. එබැවින් එම පිළිතුරු මගින් සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණ හා මහාකෝණී ත්‍රිකෝණ සඳහා sin සූත්‍රයෙහි සාධනය ඉදිරිපත් වී නොතිබිණි.
- (b) දී ඇති ප්‍රකාශනය නිවැරදිව සුළු කර $\tan \theta$ හි වර්ග සමීකරණයක් සකස් කර ගැනීමේ දුර්වලතා සහ එමගින් ලැබෙන සමීකරණයෙහි මූල තාත්ත්වික වීම සඳහා අවශ්‍යතාව නිවැරදිව හඳුනාගෙන නොතිබීම හේතුවෙන් ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 29%කට සීමා වී තිබිණි.
- (c) මෙම කොටසෙහි සපයා තිබූ බොහෝ පිළිතුරුවල වුව ද a , b , α හි අගය සඳහන් කර නොතිබීම පිළිතුර සම්පූර්ණ නොවීමට හේතු වී තිබිණි. මෙහි අවසාන කොටසට පිළිතුරු ලිවීමේදී මුල් කොටසට ඇති සම්බන්ධතාව යොදා නොගැනීම නිසා පහසුතාව 30% තරම් පහළ මට්ටමක පැවතිණි.

ත්‍රිකෝණමිතියට අයත් මූලික සිද්ධාන්ත පිළිබඳ නිසි දැනුම හා අවබෝධය ප්‍රමාණවත් තරමින් සිසුන් තුළ නොමැති වීමත් ප්‍රශ්නයෙහි අග කොටස්වලට පිළිතුරු ලිවීමේදී මුල් කොටස්වල ලබා ගත් ප්‍රතිඵල භාවිත කර නොතිබීමත් නිසා සිසුන්ගේ පිළිතුරු සතුටුදායක මට්ටමකට ළඟා වී නොමැති හෙයින්, මූලික ත්‍රිකෝණමිතික සිද්ධාන්ත පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය වන පරිදි හා එක් ප්‍රතිඵලයකින් තවත් ප්‍රතිඵලයක් ව්‍යුත්පන්න කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙන පරිදි සුදුසු අභ්‍යාසවල සිසුන් නිරත කරවීම අවශ්‍ය වේ.

2.2 II ප්‍රශ්න පත්‍රය හා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ තොරතුරු

2.2.1 II ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය

කාලය පැය 03කි. මුළු ලකුණු 100කි.

- ★ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් සමන්විත ය.

A කොටස - ප්‍රශ්න දහයකි. ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 25 බැගින් ලකුණු 250කි.

B කොටස - ප්‍රශ්න හතකි. ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 150 බැගින් ලකුණු 750කි.

II පත්‍රය සඳහා මුළු ලකුණු = $(250 + 750) \div 10 = 1000 \div 10 = 100$

- ★ විභාගයේදී A කොටසට, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා සපයා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය තුළ පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

2.2.2. II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි ප්‍රශ්න සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා

(10) සංයුක්ත ගණිතය II - A කොටස

1 වන ප්‍රශ්නය

1. දකුණු දිශාවට සෘජු මාර්ගයක් දිගේ $u \text{ km h}^{-1}$ වේගයෙන් දුවන පිරිමි ළමයෙකුට සුළඟක් බටහිර දිශාවට හමා යනු දකුණේ. උතුරු දිශාවට සෘජු මාර්ගයක් දිගේ එම වේගයෙන්ම ඔහු දුවන විට ඔහුට සුළඟ නිරිත දිශාවට හමා යනු දකුණේ. සුළගේ චලිත සඳහා සාපේක්ෂ ප්‍රවේගවල ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණ එකම රූප ගවහරක අඳින්න.

එ නිසින්, සුළගේ සත්‍ය වේගය හා දිශාව සොයන්න.


v යනු සුළගේ සත්‍ය වේගය යැයි ද, θ යනු

සුළගේ සත්‍ය දිශාව යැයි ද ගනිමු.

$$DB = 2u \tan \frac{\pi}{4} = 2u \quad (05)$$

$$v = \sqrt{(2u)^2 + u^2} = \sqrt{5}u. \quad (05)$$

$$\tan \theta = \frac{2u}{u} = 2 \Rightarrow \theta = \tan^{-1} 2 \quad (05) \quad [15]$$



1 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

බොහෝ අපේක්ෂකයන් ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණ නිවැරදිව ඇඳ නොතිබුණි. දිශා ද නිවැරදිව දක්වා නොතිබුණු නිසා අවසාන පිළිතුර කරා ළඟාවීමට නොහැකිවීමෙන් ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 30% තරම් පහළ මට්ටමක පැවතුණි. මෙවැනි අභ්‍යාසවලදී දී ඇති තොරතුරු සපුරාලන රූප සටහන නිවැරදිව ඇඳ ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

2 වන ප්‍රශ්නය

2. වැඩිතම බෑවුම් රේඛාව නිරසා α කෝණයකින් ආනත බෑවුමක් දිගේ එහි මුදුනේ සිට නිශ්චලතාවෙන් ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් මුදු හැරේ. මුදුනේ සිට d දුරක් පහළට චලනය වීම සඳහා අංශුවට තත්පර පහක් ගතවේ නම්, අංශුවේ චලිතයට එරෙහි ප්‍රතිරෝධය වන R නියතයක් යැයි උපකල්පනය කරමින්, $R = m(g \sin \alpha - 2d)$ බව පෙන්වන්න.

මුදුනේ සිට ගමන් කරන ලද දුර d වන විට, අංශුවේ ප්‍රවේගය ද සොයන්න.


බෑවුම දිගේ පහළට අංශුවේ චලිතය සඳහා $F = ma$ යෙදීමෙන්

$$mg \sin \alpha - R = mf \quad \text{ලැබේ.} \quad (05) \quad \text{මෙහි } f \text{ යනු අංශුවේ ත්වරණය වේ.}$$

$$f = g \sin \alpha - \frac{R}{m}$$

$$\text{බෑවුම දිගේ පහළට අංශුවේ චලිතය සඳහා } s = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad \text{යෙදීමෙන්}$$

$$d = \frac{1}{2} \left(g \sin \alpha - \frac{R}{m} \right) t^2 \Rightarrow R = m(g \sin \alpha - 2d) \quad (05) \quad [15]$$



$$\therefore f = g \sin \alpha - (g \sin \alpha - 2d) = 2d \quad (05)$$

බෑවුම දිගේ පහළට අංශුවේ චලිතය සඳහා $v = u + at$ යෙදීමෙන්

$$v = 2d.t \Rightarrow v = 2d \quad \text{ලැබේ.} \quad (05) \quad [10]$$

2 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

ප්‍රශ්නය ව්‍යුහගත කර ඇති අනුපිළිවෙලට පිළිතුරු සැපයූයේ නම් පිළිතුරට හිමි මුළු ලකුණු ලබා ගැනීමේ පහසුතාව වැඩිවීමට ඉඩ තිබුණි. II පත්‍රයෙහි A කොටසේ පහසුතාව 50% ඉක්මවූ ප්‍රශ්න දෙක අතුරෙන් එක් ප්‍රශ්නයක් මෙය වේ.

3 වන ප්‍රශ්නය

3. සුමට කිරස් තලයක සිට h උසින් පිහිටි, ස්කන්ධය m වූ සුමට අංශුවක් ගුරුත්වය යටතේ නිශ්චලතාවෙන් වැටෙන අතර තලයේ ගැටී පොලා පති. ගැටීම නිසා ඇති වන චාලක ශක්ති හානිය $\frac{mgh}{4}$ වේ නම්, අංශුව හා තලය අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය සොයන්න. අංශුව $\frac{3h}{4}$ උසකට පොලා පතින බව පෙන්වන්න.

v යනු තලයේ ගැටීමට මොහොතකට පෙර අංශුවේ ප්‍රවේගය යැයි ගනිමු.

එවිට, $v = \sqrt{2gh}$ වේ. (05)

තලයේ ගැටීමෙන් මොහොතකට පසු අංශුවේ ප්‍රවේගය ev ; (05) මෙහි e යනු අංශුව හා තලය අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය වේ.

$$\begin{aligned} \text{ගැටීම නිසා ඇතිවන චාලක ශක්ති හානිය} &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(ev)^2 \\ &= \frac{1}{2}mv^2(1 - e^2) = \frac{mgh}{4} \\ \Rightarrow mgh(1 - e^2) &= \frac{mgh}{4} \Rightarrow e = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (05) \quad [15] \end{aligned}$$

උඩු අතට අංශුවේ චලිතය සඳහා $v^2 = u^2 + 2as$ යෙදීමෙන්

$0 = (ev)^2 - 2gs$; (05) මෙහි s යනු අංශුව පොලා පතින උස වේ.

$$s = \frac{(ev)^2}{2g} = \frac{\frac{3gh}{4}}{2g} = \frac{3}{4}h \quad (05) \quad [10]$$

3 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

බොහෝ අපේක්ෂකයන් චාලක ශක්ති හානිය නිවැරදිව සොයා එමඟින් අංශුව පොලා පතින උස පළමුව ලබාගෙන පසුව ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය සොයා ගෙන තිබිණි. නිවැරදි පරීක්ෂණාත්මක නියමයේ යෙදීම් හා චාලක ශක්ති හානිය ගණනය කිරීම පිළිබඳ නිසි අවබෝධයකින් තොරව පිළිතුරු සපයා තිබූ බැවින්, පිළිතුරු සතුටුදායක මට්ටමක නොපැවතුණි.

4 වන ප්‍රශ්නය

4. ස්කන්ධය m වූ P නම් අංශුවක් දිග l වන සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක එක් කෙළවරකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර තන්තුවේ අනෙක් කෙළවර අවල O නම් ලක්ෂ්‍යයකට සම්බන්ධ කර ඇත. සිරස් තලයක අංශුව නිදහස් ලෙස එල්ලෙමින් පවතින විට සිරස් තලයේ OP ට ලම්භව $\sqrt{2gl}$ ප්‍රවේගයක් අංශුවට දෙනු ලැබේ. ශක්ති සංස්ථිති මූලධර්මය යොදනනිමින්, OP යටි අත් සිරස් සමග $\frac{\pi}{3}$ කෝණයක් යාදන විට P අංශුවේ ප්‍රවේගය සොයන්න. මෙම මොහොතේ දී තන්තුවේ ආතතිය $\frac{3}{2}mg$ බව පෙන්වන්න.

ශක්ති සංස්ථිති මූලධර්මය යෙදීමෙන්

$$\frac{1}{2}m(2gl) - mgl = \frac{1}{2}mv^2 - mgl \cos \frac{\pi}{3} \quad \text{ලැබේ.} \quad (10)$$

$$\therefore v = \sqrt{gl} \quad (05)$$

(15)


PO දිගේ අංශුවේ චලිතය සඳහා $F = ma$ යෙදීමෙන්

$$T - mg \cos \frac{\pi}{3} = \frac{mv^2}{l} = mg \quad \text{ලැබේ.} \quad (05)$$

$$T - \frac{1}{2}mg = mg \quad \because v = \sqrt{gl} \quad (05)$$

$$T = \frac{3}{2}mg$$

[10]



4 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

අපේක්ෂකයන් වැඩි දෙනෙක් සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබුණි. පහසුතාව ද 65%ක් වන, තරමක් ඉහළ මට්ටමක පැවතුණි. II පත්‍රයෙහි A කොටසේ පහසුතාව වැඩිම ප්‍රශ්නය මෙයයි.

5 වන ප්‍රශ්නය

5. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$ වේ; මෙහි $\mathbf{i}$ හා $\mathbf{j}$ ට සුපුරුදු අර්ථ ඇත. $\mathbf{b}$ යනු විශාලත්වය $\sqrt{3}$ සහිත දෛශිකයකි. $\mathbf{a}$ හා $\mathbf{b}$ දෛශික අතර කෝණය $\frac{\pi}{3}$ නම්, $\mathbf{b}$ යන්න $x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$, ආකාරයෙන් සොයන්න; මෙහි $x (< 0)$ හා y යනු නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ.

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2 \quad \text{හා} \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{3} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}) \cdot (x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) = x + \sqrt{3}y = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \frac{\pi}{3} = 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} \Rightarrow x = \sqrt{3}(1 - y) \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$x^2 + y^2 = 3(1 - y)^2 + y^2 = 3 \Rightarrow 4y^2 - 6y = 0 \Rightarrow y = 0 \quad \text{හෝ} \quad \frac{3}{2} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$y = 0 \quad \text{විට} \quad x = \sqrt{3} \quad \text{වේ.}$$

$$y = \frac{3}{2} \quad \text{විට} \quad x = \sqrt{3} \left(1 - \frac{3}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{වේ.}$$

$$\text{එවිට, } \mathbf{b} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{3}{2}\mathbf{j} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

[25]

5 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

සංකේතාත්මකව දෛශික නිරූපණය කිරීම නිවැරදි නොවීම බොහෝ පිළිතුරුවල දක්නට ලැබුණු දුර්වලතාවක් වන අතර දෛශික දෙකක අදිශ ගුණිතයෙහි භාවිත හැකියාව ද ඉතාමත් අඩු මට්ටමක පැවතුණි. මෙම ප්‍රශ්නයට අදාළ සංඛ්‍යාත්මක පිළිතුරුවල සුළු කිරීමේ දුර්වලතා ද දක්නට තිබුණි. මේ හේතු නිසා ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 17%ක තරම් පහළ මට්ටමක පැවතුණි.

6 වන ප්‍රශ්නය

6. බර W හා දිග $2a$ වන AB එකාකාර දණ්ඩක් එහි A කෙළවර රළු නිරස් පොළවක් මත ද, B කෙළවර AB අඩංගු සිරස් කලයට ලම්භ ස්‍රමට සිරස් තාප්පයකට එරෙහි ව ද සිටින ජෙස් සම්තුලිතතාවේ පවතී. දණ්ඩ යන පොළොව අතර සර්ඡණ සංගුණකය $\sqrt{\frac{3}{2}}$ නම්, දණ්ඩ ලිස්සා යෑමට ආසන්න මොහොතේදී දණ්ඩ නිරසට ආනතිය සොයන්න.

නිරස්ව බල විභේදනයෙන් $F = S$ ලැබේ. (05)


සිරස්ව බල විභේදනයෙන් $R = W$ ලැබේ. (05)

A වටා සුර්ණ ගැනීමෙන්

$$W a \cos \theta = S 2a \sin \theta \Rightarrow S = \frac{1}{2} W \cot \theta \quad \text{ලැබේ. (05)}$$

$$\frac{F}{R} = \frac{1}{2} \cot \theta \leq \mu = \sqrt{\frac{3}{2}} \Rightarrow \tan \theta \geq \frac{1}{\sqrt{6}} \quad (05)$$

$$\text{අවශ්‍ය කෝණය} \quad \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) \text{ වේ. (05)}$$



[25]

6 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

නිවැරදි රූප සටහනක් ඇඳ සර්ඡණ බලයේ දිශාව නිවැරදිව ලකුණු කර නොතිබීම නිසා පිළිතුරු සාර්ථක වී තිබුණේ ඉතා අඩුවෙනි. දණ්ඩේ නිරසට ආනතිය වන θ දැක්වීමේදී $\tan \theta$ හි අගය පමණක් දී තිබූ බැවින් සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

7 වන ප්‍රශ්නය

7. A, B හා C යනු Ω නියැදි අවකාශයෙහි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර හා නිරවශේෂ සිද්ධි යැයි ගනිමු. $P(A) = 2p$, $P(B) = p^2$ හා $P(C) = 4p - 1$ නම්, p හි අගය සොයන්න.

A, B හා C නිරවශේෂ බැවින් $A \cup B \cup C = \Omega$ වේ.

$$P(A \cup B \cup C) = P(\Omega) = 1 \quad (05)$$

නමුත්, A, B හා C අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර බැවින්

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$= 2p + p^2 + 4p - 1 = 1 \quad (05)$$

$$\text{එනම්, } p^2 + 6p - 2 = 0 \Rightarrow p = -3 \pm \sqrt{11} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$p \text{ සෘණ විය නොහැකි බැවින් } p = -3 + \sqrt{11} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

[25]

7 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

නියැදි අවකාශයට අයත් සිද්ධි සියල්ල සිදුවීමේ සම්භාවිතාව 1 බව නොසැලකීමත් නිරවශේෂ සහ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර යන වචනවල අර්ථ නොදැනීම හෝ ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් නොවීමත් නිසා බොහෝ දෙනෙකුට පිළිතුර ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

8 වන ප්‍රශ්නය

8. A, B හා C යනු Ω නියැදි අවකාශයෙහි ස්වායත්ත සිද්ධි තුනක් යැයි ගනිමු. A හා $(B \cup C)$ යනු ස්වායත්ත සිද්ධි බව පෙන්වන්න.

$$P\{A \cap (B \cup C)\} = P\{(A \cap B) \cup (A \cap C)\} \quad (05)$$

$$= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P\{(A \cap B) \cap (A \cap C)\} \quad (05)$$

$$= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C) \quad (05)$$

$$= P(A)P(B) + P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) \quad A, B \text{ හා } C \text{ ස්වායත්ත සිද්ධි බැවින්}$$

$$= P(A)\{P(B) + P(C) - P(B)P(C)\}$$

$$= P(A)\{P(B) + P(C) - P(B \cap C)\} \quad (05)$$

$$= P(A)\{P(B \cup C)\} \quad (05)$$

එබැවින්, A හා $(B \cup C)$ ස්වායත්ත සිද්ධි වේ.

[25]

8 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

කුලක ආශ්‍රිත සම්භාවිතාව පිළිබඳ මූලික දැනුම ඉතා අඩු බව දක්නට ඇත. ස්වායත්තතාව පිළිබඳ මූලික ප්‍රමේය සාධනය කිරීමේදී ලබා ගත් දැනුම, වෙනත් අවස්ථාවකට යොදා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. මේ නිසාම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 11%ක තරම් ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතුණි.

9 වන ප්‍රශ්නය

9. නිරීක්ෂණ 100 ක මධ්‍යන්‍යය හා සම්මත අපගමනය පිළිවෙළින් 30 හා 4.1 ලෙස ගණනය කර ඇත. එක් නිරීක්ෂණයක්, නිවැරදි අගය 30 වෙනුවට 40 සාවද්‍ය ලෙස ලේඛන ගත කර ඇති බව පසුව සොයාගෙන ඇත. නිරීක්ෂණ 100 හි නිවැරදි මධ්‍යන්‍යය හා සම්මත අපගමනය ආගණනය කරන්න.

$$\text{නිවැරදි මුළු එකතුව} = 100 \times 30 - 40 + 30 = 2990. \text{ (05)}$$

$$\therefore \text{නිවැරදි මුළු මධ්‍යන්‍යය} = \frac{2990}{100} = 29.9. \text{ (05)} \quad [10]$$

$$\begin{aligned} \text{වර්ගවල නිවැරදි මුළු එකතුව} &= 100(4.1^2 + 30^2) - 40^2 + 30^2 \text{ (05)} \\ &= 100(16.81 + 900) - 700 \\ &= 91681 - 700 = 90981 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{නිවැරදි විචලතාව} = \frac{90981}{100} - 29.9^2 = 909.81 - 894.01 = 15.8 \text{ (05)}$$

$$\therefore \text{නිවැරදි සම්මත අපගමනය} = \sqrt{15.8} = 3.975 \text{ හෝ } 3.97 \text{ (05)} \quad [15]$$

9 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයූ අපේක්ෂකයන් පළමුවන කොටසට සාර්ථක පිළිතුරු දී තිබූ නමුත් දෙවන කොටසේදී සුළු කිරීමේ දුර්වලතා දක්නට ලැබිණි. මේ නිසා සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක මධ්‍යන්‍යය හා සම්මත අපගමනය ආශ්‍රිත සරල ගණනය කිරීමේ භාවිත පිළිබඳ දුෂ්කරතා ද දැකිය හැකිවිය.

10 වන ප්‍රශ්නය

10. ස්වකීය සිසුන්ට දෙන ලද පරීක්ෂණයක් සඳහා A හා B පාසල්වල මධ්‍යන්‍ය ලකුණු පිළිවෙළින් 31 හා 45 වෙයි. A පාසලෙහි ලකුණුවල ව්‍යාප්තියේ සම්මත අපගමනය 5 වෙයි. ප්‍රතිඵල සැසඳීම සඳහා B පාසලෙහි මධ්‍යන්‍ය හා සම්මත අපගමනය, A පාසලෙහි ඒවාට සමාන ද, B පාසලෙහි ලකුණු 85 පරිණාමනය යටතේ ලකුණු 63 ද වන පරිදි රේඛීය පරිණාමනයක් මගින් B පාසලෙහි ලකුණු පරිමාණය කෙරේ. රේඛීය පරිණාමනය සොයා, ඒ තුළින්, B පාසලෙහි ලකුණුවල ව්‍යාප්තියේ මුල් සම්මත අපගමනය සොයන්න.

$y = ax + b$ යනු රේඛීය පරිණාමනය යැයි ගනිමු; මෙහි x යනු මුල් අගය හා y යනු නව අගය වේ.

එවිට, $63 = 85a + b \rightarrow (1)$ ලැබේ. (05)

$\bar{y} = a\bar{x} + b \Rightarrow 31 = 45a + b \rightarrow (2)$ (05)

$(1) - (2) \Rightarrow 40a = 32 \Rightarrow a = 0.8$

(1) න් $31 = 45 \times 0.8 + b \Rightarrow b = -5$ යැයි ලැබේ.

එබැවින්, රේඛීය පරිණාමනය $y = 0.8x - 5$ වේ. (05)

[15]

y හි සම්මත අපගමනය = $a \times x$ හි සම්මත අපගමනය

$\Rightarrow 5 = \frac{4}{5} \times x$ හි සම්මත අපගමනය $\Rightarrow x$ හි සම්මත අපගමනය = 6.25

(05)

(05)

[10]

10 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නයට අදාළ සංඛ්‍යාතය හා රේඛීය (ඒකජ) පරිණාමන පිළිබඳ දැනුම බහුතරයකට නොතිබිණි. මේ නිසා පහසුතාව 6%කට සීමා වී තිබුණි.

(10) සංයුක්ත ගණිතය II - B කොටස

11 වන ප්‍රශ්නය

11.(a) P නම් අංශුවක් O ලක්ෂ්‍යයේ දී ගුරුත්වය යටතේ u ප්‍රවේගයෙන් සිරස් ලෙස ඉහළට ප්‍රක්ෂේප කෙරේ.

$\frac{u}{2g}$ කාලයකට පසු, Q නම් තවත් අංශුවක් O ලක්ෂ්‍යයේ දී ගුරුත්වය යටතේ $v(>u)$ ප්‍රවේගයෙන් සිරස් ලෙස ඉහළට ප්‍රක්ෂේප කෙරේ. A යනු P අංශුව ළඟා වන ඉහළතම ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු. P හා Q අංශු A ලක්ෂ්‍යයේදී හමුවෙයි. P හා Q අංශුවල සම්පූර්ණ චලිත සඳහා ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්ථාර එකම රූප සටහනක අඳින්න.

මෙම ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්ථාර යොදාගෙන

(i) $OA = \frac{u^2}{2g}$ බව,

(ii) $v = \frac{5u}{4}$ හා A ලක්ෂ්‍යයේදී Q අංශුවේ ප්‍රවේගය $\frac{3u}{4}$ බව,

(iii) Q අංශුව ඉහළතම ලක්ෂ්‍යයට ළඟාවන විට P අංශුව, O ලක්ෂ්‍යයේ සිට පිහිටන දුර $\frac{7u^2}{32g}$ බව පෙන්වන්න.

(b) ස්කන්ධය M kg වන මෝටර් රථයක් සියලු වේග සඳහා නියතයක් වන R ප්‍රතිරෝධයකට එරෙහිව තැනිතලා මාර්ගයක ගමන් කෙරේ. එන්ජිමෙහි උපරිම බලය H kW හා තැනිතලා මාර්ගයක මෝටර් රථයේ උපරිම වේගය v m s⁻¹ නම්, M , H හා v ඇසුරෙන් R ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

තිරයට α කෝණයකින් ආනත සෘජු මාර්ගයක් දිගේ

(i) $\frac{v}{3}$ m s⁻¹ වේගයෙන් කෙළින්ම ඉහළට,

(ii) $\frac{v}{2}$ m s⁻¹ වේගයෙන් කෙළින්ම පහළට

චලනය වන විට M , H , v , g හා α ඇසුරෙන් මෝටර් රථයේ ත්වරණය සොයන්න.

(ii) අවස්ථාවේදී මෝටර් රථයේ ත්වරණය (i) අවස්ථාවේදී මෝටර් රථයේ ත්වරණය මෙන් දෙගුණයක් නම්, M , H , v හා g ඇසුරෙන් $\sin \alpha$ සොයන්න.

මෙම අවස්ථාවේදී, මෝටර් රථය මාර්ගයේ කෙළින්ම ඉහළට චලනය වන විට එයට ලබාගත හැකි උපරිම වේගය v ඇසුරෙන් සොයන්න.

(a) (i) T යනු අංශුවට A ලක්ෂ්‍යයට ළඟාවීමට ගතවන කාලය යැයි ගනිමු.


එවිට, ප්‍රස්ථාරයෙන් $T = \frac{u}{g}$ ලැබේ. (05)

තවද, ප්‍රස්ථාරයෙන්

$$OA = \frac{1}{2}uT = \frac{u^2}{2g} \text{ යැයි ලැබේ.}$$

(05)

[10]



(ii) v_1 යනු A ලක්ෂ්‍යයේදී Q අංශුවේ ප්‍රවේගය යැයි ගනිමු.

එවිට, Q සඳහා ප්‍රස්ථාරයෙන්

$$\frac{v - v_1}{T - \frac{u}{2g}} = g \Rightarrow v_1 = v - g \left(T - \frac{u}{2g} \right) = v - \frac{u}{2} \rightarrow (1) \quad \text{ලැබේ.}$$

(05)

(05)

තවද, ප්‍රස්ථාරයෙන්

$$\left(\frac{v + v_1}{2} \right) \left(T - \frac{u}{2g} \right) = \frac{u^2}{2g} \Rightarrow v + v_1 = 2u \rightarrow (2) \quad \text{ලැබේ.}$$

(05)

(05)

$$(1) \text{ හා } (2) \text{ න් } v = \frac{5u}{4} \text{ හා } v_1 = \frac{3u}{4} \quad \text{ලැබේ.}$$

(05)

(05)

[30]

(iii) T_1 යනු Q අංශුව ස්වකීය ඉහළතම ලක්ෂ්‍යයට ළඟාවීමට ගතවන කාලය ද u_1 යනු මෙම මොහොතේදී P අංශුවේ ප්‍රවේගය යැයි ද ගනිමු.

එවිට, Q සඳහා ප්‍රස්ථාරයෙන්

$$T_1 - \frac{u}{2g} = \frac{v}{g} \Rightarrow T_1 = \frac{5u}{4g} + \frac{u}{2g} = \frac{7u}{4g} \text{ හා } \frac{u_1}{T_1 - T} = -g \Rightarrow u_1 = -\frac{3u}{4} \quad \text{යැයි ලැබේ.}$$

(05)

(05)

Q අංශුව ස්වකීය ඉහළතම ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටන විට O ලක්ෂ්‍යයේ සිට P අංශුවේ පිහිටීමට උස h යැයි ගනිමු.

එවිට, ප්‍රස්ථාරයෙන්

$$h = \frac{1}{2} \left(u + \frac{3u}{4} \right) (2T - T_1) = \left(\frac{7u}{8} \right) \left(\frac{2u}{g} - \frac{7u}{4g} \right) = \frac{7u^2}{32g} \quad \text{යැයි ලැබේ.}$$

(05)

(05)


[20]

(b) උපරිම වේගයේදී ත්වරණයක් නොමැති අතර මෝටර් රථය මත ක්‍රියා කරන බල සමතුලිතතාවේ පවතී.

එවිට, $F - R = 0$ යැයි ලැබේ. (05)

$$Fv = P \Rightarrow Fv = 10^3 H \Rightarrow F = \frac{10^3 H}{v} \quad (05)$$

$$\text{එබැවින්, } R = \frac{10^3 H}{v} \quad \text{ලැබේ. (05)}$$



[15]

- (i) සෘජු මාර්ගය දිගේ කෙළින්ම ඉහළට චලනය වන විට මෝටර් රථයේ ත්වරණය a යැයි ගනිමු.


$$F = \frac{10^3 H}{\frac{v}{3}} = \frac{3 \times 10^3 H}{v} \quad (05)$$

එවිට, $F - Mg \sin \alpha - R = Ma$ ලැබේ. (05)

$$\frac{3 \times 10^3 H}{v} - Mg \sin \alpha - \frac{10^3 H}{v} = Ma$$

$$a = \frac{2 \times 10^3 H}{Mv} - g \sin \alpha \quad (05)$$

[15]



- (ii) සෘජු මාර්ගය දිගේ කෙළින්ම පහළට චලනය වන විට මෝටර් රථයේ ත්වරණය a' යැයි ගනිමු.


$$F = \frac{10^3 H}{\frac{v}{2}} = \frac{2 \times 10^3 H}{v} \quad (05)$$

එවිට, $F + Mg \sin \alpha - R = Ma'$ ලැබේ. (05)

$$\frac{2 \times 10^3 H}{v} + Mg \sin \alpha - \frac{10^3 H}{v} = Ma'$$

$$a' = \frac{10^3 H}{Mv} + g \sin \alpha \quad (05)$$

[15]



$$a' = 2a \Rightarrow \frac{10^3 H}{Mv} + g \sin \alpha = 2 \left(\frac{2 \times 10^3 H}{Mv} - g \sin \alpha \right) \Rightarrow \sin \alpha = \frac{10^3 H}{Mgv} \quad (05) \quad (05)$$

[10]

සෘජු මාර්ගය දිගේ කෙළින්ම ඉහළට චලනය වන විට මෝටර් රථයේ උපරිම වේගය v_1 යැයි ගනිමු.

$$F_1 = \frac{10^3 H}{v_1} \quad (05)$$


උපරිම වේගයේදී ත්වරණයක් නොමැති අතර මෝටර්

රථය මත ක්‍රියා කරන බල සමතුලිතතාවේ පවතී.


එවිට, $F_1 - Mg \sin \alpha - R = 0$ යැයි ලැබේ. (05)

$$\frac{10^3 H}{v_1} - Mg \left(\frac{10^3 H}{Mgv} \right) - \frac{10^3 H}{v} = 0 \Rightarrow v_1 = \frac{v}{2} \quad (05)$$

[15]




11 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 93%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 46%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 26%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 16%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 12%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 9ක් ඇති අතර (b)හි අවසාන අනුකොටස හැර අන් සියලු කොටස්වල පහසුතා 49%ට අඩු නොවේ. එම අනුකොටසෙහි පමණක් පහසුතාව 35%ක් වේ. (a) හි පළමුවන අනුකොටසෙහි පහසුතාව උපරිම වන අතර එය 89%ක් වේ.

(11) අපේක්ෂකයන්ගෙන් වැඩිම පිරිසක්, එනම් 92.5%ක්ම තෝරාගෙන ඇති ප්‍රශ්නයයි. එහෙත් එම පිළිතුරුවලින් 46%කටම ලැබී ඇත්තේ ප්‍රශ්නයට හිමි ලකුණුවලින් 25%ක් හෝ ඊට අඩුවෙනි.

(a) අංශු දෙකෙහි සම්පූර්ණ චලිතය නිරූපණය කෙරෙන ප්‍රස්තාර ඇඳීම සඳහා අපේක්ෂකයින් උපයා ගෙන ඇත්තේ ඊට හිමි මුළු ලකුණුවලින් 53%ක් පමණි. එහෙත් එහි (i) කොටසට හිමි ලකුණුවලින් 89%ක්ම හිමි කර ගැනීමට ඔවුන් සමත් වී ඇත. (ii) කොටස සඳහා ප්‍රතිචාර එතරම් සතුටුදායක නොවන අතර සාධනය කළ යුතු ප්‍රතිඵල දෙකෙන් එකක් භාවිත කර අනෙක් ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම ද සමහර පිළිතුරුවල දක්නට ලැබුණු අඩුපාඩුවක් විය. (iii) කොටසෙහි පිළිතුර ලබා ගැනීම වඩාත් දුර්වල මට්ටමක තිබිණි.

(b) මෙහි (i) සහ (ii) අනුකොටස්වලට තරමක් සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා තිබූ නමුත් අවසාන කොටස් සඳහා සැපයුණු පිළිතුරු බොහෝ විට අසාර්ථක විය. ඒකක නිවැරදිව භාවිත කිරීමේ හා පරිවර්තනය කිරීමේ එනම් කිලෝවොට් (kW), වොට් (W) බවට පරිවර්තනය කිරීමේ දුර්වලතා නිසා ද ලකුණු අහිමි වී ඇති බව සඳහන් කළ යුතු වේ.

(a) කොටස සඳහා දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරයක් නිවැරදිව ඇඳ ගැනීමත් එහි ලක්ෂණ (ගුණ) හඳුනාගැනීමත් (b) කොටස සඳහා නිවැරදි ඒකක පරිවර්තන යොදා ගනිමින් වලිනයට අදාළ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීමත් සඳහා වැඩි අවබෝධයක් ලැබෙන පරිදි සුදුසු අභ්‍යාසවල සිසුන් නිරත කරවීම අවශ්‍ය වේ.

12 වන ප්‍රශ්නය

12. (a) O ලක්ෂ්‍යයක සිට k උසකින් පිහිටි C නම් ලක්ෂ්‍යයකදී තිරසර θ කෝණයකින් ආනතව u ප්‍රවේගයෙන් අංශුවක් ගුරුත්වය යටතේ සිරස් තලයක ප්‍රක්ෂේප කෙරේ. ප්‍රක්ෂේපණ තලය මත O ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ තිරස් හා සිරස් රේඛා පිළිවෙළින් Ox හා Oy අක්ෂ ලෙස ගනිමින් සෘජුකෝණාස්‍ර කාටීසියානු ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක් සලකමු. t කාලයේදී අංශුව (x, y) ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටයි නම්,

$$y = k + x \tan \theta - \frac{gx^2 \sec^2 \theta}{2u^2} \quad \text{බව පෙන්වන්න.}$$

h ධන වන $A(0, h)$ ලක්ෂ්‍යයේදී තිරසර α කෝණයකින් ආනතව v ප්‍රවේගයෙන් P නම් අංශුවක් ගුරුත්වය යටතේ සිරස් තලයේ ප්‍රක්ෂේප කෙරේ. එම මොහොතේදීම $B\left(0, \frac{h}{2}\right)$ ලක්ෂ්‍යයේදී තිරසර $\beta (> \alpha)$ කෝණයකින් ආනතව w ප්‍රවේගයෙන් Q නම් තවත් අංශුවක් ගුරුත්වය යටතේ සිරස් තලයේ ප්‍රක්ෂේප කෙරේ. තිරස් දුර d වන ලක්ෂ්‍යයේදී P හා Q අංශු දෙක හමුවෙයි නම්,

$$v \cos \alpha = w \cos \beta \quad \text{හා} \quad h = 2d(\tan \beta - \tan \alpha) \quad \text{බව පෙන්වන්න.}$$

$$\text{අංශු හමුවීමට ගතවන කාලය} \frac{h}{2(w \sin \beta - v \sin \alpha)} \quad \text{බව ද පෙන්වන්න.}$$

- (b) තිරස් පොළොවක සිට මීටර 3 ක උසකින් පිහිටි සිවිලිමතට සැහැල්ලු අවිහ්‍යාස තන්තුවක එක කෙළවරක් සම්බන්ධ කර ඇත. තන්තුව, ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් සවිකර ඇති චලනය විය හැකි සැහැල්ලු සුමට P නම් කප්පියක් යටින් ද, සිවිලිමත සම්බන්ධ කර ඇති සැහැල්ලු සුමට කප්පියක් උඩින් ද යවා ඇත. තන්තුවේ අනෙක් කෙළවරට ස්කන්ධය $M (> m)$ වූ Q නම් අංශුවක් සම්බන්ධ කර ඇත. චලනය විය හැකි P කප්පිය හා Q අංශුව පොළවේ සිට පිළිවෙළින් මීටර $\frac{1}{2}$ ක හා මීටර 1 ක උසින් ද, කප්පි සමග ස්පර්ශ තොටන තන්තු කොටස් සිරස්ව ද පිහිටන විට පද්ධතිය නිශ්චලතාවෙන් මුද හැරේ.

Q අංශුවේ ත්වරණය හා තන්තුවේ ආතතිය සොයන්න.

$$Q \text{ අංශුව තත්පර } \sqrt{\frac{4M+m}{2(M-m)g}} \text{ කාලයකට පසුව පොළවට ළඟා වන බව හා } P \text{ කප්පිය පොළොවේ සිට}$$

$$\text{මීටර } \frac{1}{2} + \frac{3M}{4M+m} \text{ උසකට ඉහළ නගින බව පෙන්වන්න.}$$

(a) සිරසට $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ යෙදීමෙන්

$$y - k = u \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow (1) \text{ යැයි ලැබේ. (10)}$$


තිරසට $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ යෙදීමෙන්

$$x = ut \cos \theta \Rightarrow t = \frac{x}{u \cos \theta} \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

(1) න්

$$y - k = x \tan \theta - \frac{gx^2 \sec^2 \theta}{2u^2} \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

$$y = k + \tan \theta - \frac{gx^2 \sec^2 \theta}{2u^2}$$



[20]

තිරසට P අංශුවේ චලිතය සඳහා $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ යෙදීමෙන්

$$d = vt_0 \cos \alpha \rightarrow (2) \text{ වේ. (05) මෙහි } t_0 \text{ යනු අංශු}$$


දෙක හමුවන කාලය වේ.

තිරසට Q අංශුවේ චලිතය සඳහා $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ යෙදීමෙන්

$$d = wt_0 \cos \beta \rightarrow (3) \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

(2) න් (3) න්

$$v \cos \alpha = w \cos \beta \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$



[20]

P අංශුව සඳහා පළමුවන කොටසේ දී ලබාගත් ප්‍රතිඵලය යෙදීමෙන්

$$y_0 = h + d \tan \alpha - \frac{gd^2 \sec^2 \alpha}{2v^2} \rightarrow (4) \text{ වේ. (05) මෙහි } y_0 \text{ යනු අංශු දෙක හමුවන විට උස වේ.}$$

Q අංශුව සඳහා පළමුවන කොටසේ දී ලබාගත් ප්‍රතිඵලය යෙදීමෙන්

$$y_0 = \frac{h}{2} + d \tan \beta - \frac{gd^2 \sec^2 \beta}{2w^2} \rightarrow (5) \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

$$(4) \text{ හා } (5) \text{ න් } h + d \tan \alpha = \frac{h}{2} + d \tan \beta \Rightarrow h = 2d(\tan \beta - \tan \alpha) \text{ ලැබේ.}$$

(05)

[15]

$$d = \frac{h}{2(\tan \beta - \tan \alpha)} = \frac{h \cos \alpha \cos \beta}{2(\sin \beta \cos \alpha - \sin \alpha \cos \beta)} = wt_0 \cos \beta \text{ (05)}$$

$$\text{එනම්, } t_0 = \frac{h}{2w \left(\sin \beta - \sin \alpha \left(\frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \right) \right)} = \frac{h}{2w \left(\sin \beta - \sin \alpha \left(\frac{v}{w} \right) \right)} = \frac{h}{2(w \sin \beta - v \sin \alpha)}$$

(05)

(05)

[15]


(b) a යනු Q අංශුවේ ත්වරණය යැයි ගනිමු.

සිරස්ව පහළට Q අංශුවේ චලිතය සඳහා $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ යෙදීමෙන්

$$Mg - T = Ma \rightarrow (1) \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

සිරස්ව ඉහළට P කප්පියේ චලිතය සඳහා $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ යෙදීමෙන්

$$2T - mg = m\frac{a}{2} \rightarrow (2) \text{ යැයි ලැබේ. (10)}$$



$$(1) \times 2 + (2) \text{ න් } 2Mg - mg = \left(2M + \frac{m}{2}\right)a \text{ යැයි ලැබේ.}$$

$$\text{එනම්, } a = 2\left(\frac{2M - m}{4M + m}\right)g \text{ ලැබේ. (05)}$$

[30]

$$(1) \text{ න් } T = Mg - Ma = Mg\left\{1 - 2\left(\frac{2M - m}{4M + m}\right)\right\} = \frac{3mMg}{4M + m} \text{ ලැබේ.}$$

(05)

(05)

[10]

සිරස්ව පහළට Q අංශුවේ චලිතය සඳහා $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ යෙදීමෙන්

$$1 = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{2(2M - m)}{4M + m}\right)gt_0^2 \text{ වේ. (10) මෙහි } t_0 \text{ යනු පොළවට ළඟාවීමට අවශ්‍ය කාලය වේ.}$$

$$t_0 = \sqrt{\frac{4M + m}{(2M - m)g}} \text{ තත්පර}$$

[10]

h_0 යනු t_0 කාලය තුළ P කප්පිය ඉහළ නගින උස යැයි ගනිමු.

සිරස්ව ඉහළට P කප්පියේ චලිතය සඳහා $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ යෙදීමෙන්

$$h_0 = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{2M - m}{4M + m}\right)\left(\frac{4M + m}{2M - m}\right) = \frac{1}{2} \text{ මීටර යැයි ලැබේ. (05)}$$

v යනු t_0 කාලයේ දී P කප්පියේ ප්‍රවේගය යැයි ගනිමු.

සිරස්ව ඉහළට P කප්පියේ චලිතය සඳහා $v = u + at$ යෙදීමෙන්

$$v = 0 + \left(\frac{2M - m}{4M + m}\right)g\sqrt{\frac{4M + m}{2(M - m)g}} = \sqrt{\left(\frac{2M - m}{4M + m}\right)g} \text{ යැයි ලැබේ.}$$

(05)

(05)

Q අංශුව පොළවට ලඟා වූ පසු P කප්පිය ඉහළ නගින උස h_1 යැයි ගනිමු.

Q අංශුව පොළවට ලඟා වූ පසු P කප්පියේ චලිතය සඳහා සිරස්ව ඉහළට $v^2 = u^2 + 2as$


යෙදීමෙන්

$$(05) \quad 0 = \left(\frac{2M - m}{4M + m} \right) g - 2gh_1 \Rightarrow h_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{2M - m}{4M + m} \right) \text{ යැයි ලැබේ. (05)}$$

$$\text{මුළු උස} = \frac{1}{2} + h_0 + h_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{2M - m}{4M + m} \right) = \frac{1}{2} + \frac{3M}{4M + m} \text{ මීටර වේ. (05)}$$


[30]

12 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 84.9%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 33%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 31%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 24%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 12%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 7ක් ඇති අතර එම සියලුම අනුකොටස්වල පහසුතා 50% ඉක්මවා ඇත. ඒවා අතුරෙන් වැඩිම පහසුතාව ඇත්තේ (b)හි අවසාන අනුකොටසට වන අතර එය 79%කි. අඩුම පහසුතාව ඇත්තේ (a)හි අවසාන අනුකොටසට වන අතර එය 52%කි.

(12) තරමක් සතුටුදායක ලෙස පිළිතුරු සපයා ඇති ප්‍රශ්නයකි.

(a) පළමුවන කොටසට සාර්ථකව පිළිතුරු දී ඇති බොහෝ දෙනෙකුට වුව ද රූපසටහන නිවැරදිව ඇඳීමට අපොහොසත් වීම නිසා ඉතිරි කොටස් දෙකට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. ප්‍රශ්නය හොඳින් කියවා අවබෝධ කර ගැනීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

- (b) රූප සටහනක බල සහ ත්වරණ ලකුණු කිරීම, සවල කප්පියෙහි චලිත ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම හා ඒ අනුව ප්‍රශ්නයෙහි අවසාන කොටසට සැපයිය යුතු පිළිතුර සංවිධානය කර ගැනීම පිළිබඳව අවබෝධය දුර්වල මට්ටමක පැවතීම පිළිතුරු අසාර්ථක වීමට හේතු වී ඇති බව නිගමනය කළ හැකිය.

ප්‍රශ්නය නිවැරදිව කියවා අවබෝධ කර ගෙන ඒ අනුව නිවැරදි රූප සටහන් ඇඳ අදාළ තොරතුරු එම රූපවල නිරූපණය කිරීම ද, ඒ ඇසුරින් සම්බන්ධතා/සමීකරණ ගොඩ නගා අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ව්‍යුත්පන්න කර ගැනීම ද සඳහා සරල ව්‍යුහගත අභ්‍යාස මගින් පරිවය ලබා ගත යුතු වේ.

13 වන ප්‍රශ්නය

13. A හා B යනු සුමට කිරස් මේසයක් මත එකිනෙක අතර දුර $8l$ වන ලක්ෂ්‍ය දෙකකි. ජ්‍යාමිතිකය m වූ P නම් සුමට අංශුවක් A හා B අතර, AB මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක තබා ඇත. ස්වාභාවික දිග $3l$ හා ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය 4λ වන සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක් මගින් A ලක්ෂ්‍යයට ද, ස්වාභාවික දිග $2l$ හා ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය λ වන සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක් මගින් B ලක්ෂ්‍යයට ද P අංශුව සම්බන්ධ කෙරේ.

P අංශුව C ලක්ෂ්‍යයේදී සමතුලිතතාවේ පවතී නම්, $AC = \frac{42}{11}l$ බව පෙන්වන්න.

P අංශුව AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන M ලක්ෂ්‍යයේ තබා නිශ්චලතාවෙන් මුද්‍රා හැරේ. P අංශුව, AB දිගේ A ලක්ෂ්‍යයේ සිට x දුරින් පිහිටන විට තන්තු දෙකෙහි ආතති ලබාගන්න.

$\frac{40}{11}l \leq x \leq 4l$ සඳහා P අංශුවේ චලිත සමීකරණය ලියා දක්වා සුසුරුදු අංකනයෙන්,

$$\ddot{x} + \frac{11\lambda}{6ml} \left(x - \frac{42}{11}l \right) = 0 \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$$y = x - \frac{42}{11}l \text{ යැයි ලිවීමෙන්, } \ddot{y} + \frac{11\lambda}{6ml} y = 0 \text{ බව පෙන්වන්න.}$$


ඉහත සමීකරණයේ විසඳුම $y = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ ආකාරයේ යැයි උපකල්පනය කරමින්, A , B හා ω නියත සොයන්න.

P අංශුව A ලක්ෂ්‍යයේ සිට $\frac{41}{11}l$ දුරින් පිහිටන විට එහි ප්‍රවේගය සොයන්න.

P අංශුව C ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටන විට AP තන්තුවේ ආතතිය T යැයි ගනිමු.

P අංශුව C ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටන විට PB තන්තුවේ ආතතිය T' යැයි ගනිමු.

එවිට, හුක්ගේ නියමයෙන්



$$T = \left(\frac{AC - 3l}{3l} \right) 4\lambda \quad \text{හා} \quad T' = \left(\frac{8l - AC - 2l}{2l} \right) \lambda = \left(\frac{6l - AC}{2l} \right) \lambda \quad \text{යැයි ලැබේ.}$$

(10) (10)

C ලක්ෂ්‍යයේ දී P අංශුව සමතුලිතතාවේ පවතින බැවින්

$$T = T' \Rightarrow \left(\frac{AC - 3l}{3l} \right) 4\lambda = \left(\frac{6l - AC}{2l} \right) \lambda \Rightarrow 11AC = 42l \Rightarrow AC = \frac{42}{11}l \quad \text{යැයි ලැබේ.}$$

(05) (05) (05) [40]


P අංශුව A ලක්ෂ්‍යයේ සිට x දුරින් පිහිටන විට AP තන්තුවේ ආතතිය T_1 යැයි ගනිමු.

P අංශුව A ලක්ෂ්‍යයේ සිට x දුරින් පිහිටන විට BP තන්තුවේ ආතතිය T_2 යැයි ගනිමු.

එවිට, හුක්ගේ නියමයෙන්

$$T_1 = \left(\frac{x - 3l}{3l} \right) 4\lambda \quad \text{යැයි ලැබේ.} \quad (05)$$

$$T_2 = \left(\frac{8l - x - 2l}{2l} \right) \lambda = \left(\frac{6l - x}{2l} \right) \lambda \quad (05)$$



AB දිගේ Q අංශුවේ චලිතය සඳහා නිව්ටන්ගේ නියමය යෙදීමෙන්

$$T_2 - T_1 = m\ddot{x} \quad \text{යැයි ලැබේ.} \quad (10)$$

$$\text{එනම්, } \left(\frac{6l - x}{2l} \right) \lambda - \left(\frac{x - 3l}{3l} \right) 4\lambda = m\ddot{x} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$\text{එනම්, } m\ddot{x} + \frac{\lambda}{l} \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{2} \right) x - 7\lambda = 0 \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$\text{එනම්, } \ddot{x} + \frac{11\lambda}{6ml} x - \frac{7\lambda}{m} = 0 \quad \text{වේ.}$$

$$\text{එනම්, } \ddot{x} + \frac{11\lambda}{6ml} \left(x - \frac{42}{11}l \right) = 0 \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

[40]

$$y = x - \frac{42}{11}l \quad \text{යැයි ගනිමු.}$$

$$\text{එවිට, } \dot{y} = \dot{x} \quad \text{හා} \quad \ddot{y} = \ddot{x} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$\text{එබැවින්, } \ddot{y} + \frac{11\lambda}{6ml} y = 0 \rightarrow (1) \quad \text{යැයි ලැබේ.} \quad (05)$$

[10]

$$y = A \cos \omega t + B \sin \omega t \rightarrow (2)$$

$$\dot{y} = -A\omega \sin \omega t + B\omega \cos \omega t \rightarrow (3)$$

$$t = 0 \text{ හි දී, } x = 4l \text{ හා } \dot{x} = 0 \text{ යන්නෙන් } t = 0 \text{ හි දී, } y = \frac{2}{11}l \text{ හා } \dot{y} = 0 \text{ ගම්‍ය වේ. (05)}$$

$$\text{එබැවින්, (2) } \Rightarrow A = \frac{2}{11}l \text{ හා (3) } \Rightarrow B = 0 \text{ වේ.}$$

(05)

(05)

$$\therefore y = \frac{2}{11}l \cos \omega t \Rightarrow \ddot{y} = -\frac{2}{11}l\omega^2 \cos \omega t = -\omega^2 y \text{ වේ.}$$

$$\text{මෙය (1) සමඟ සැසඳීමෙන් } \omega^2 = \frac{11\lambda}{6ml} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}} \text{ ලැබේ. (05)}$$

[20]

$$-\frac{2}{11}l \leq y \leq \frac{2}{11}l \text{ සඳහා } y = \frac{2}{11}l \cos\left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}t\right) \text{ වේ. (05)}$$

$$\frac{40}{11}l \leq x \leq 4l \text{ සඳහා } x = \frac{42}{11}l + \frac{2}{11}l \cos\left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}t\right) \text{ වේ. (05)}$$

$$x = \frac{41}{11}l \text{ වන ලක්ෂ්‍යය කරා } P \text{ අංශුවේ ළඟාවීමට ගතවන කාලය } t_0 \text{ සැසි ගනිමු.}$$

$$\text{එවිට, } \frac{2}{11} \cos\left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}t_0\right) = \frac{41}{11} - \frac{42}{11} \Rightarrow \cos\left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}t_0\right) = -\frac{1}{2} \text{ ලැබේ.}$$

(05)

(05)

$$\Rightarrow \cos\left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}t_0\right) = -\frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}t_0 = \frac{2\pi}{3} \text{ (05)}$$

$$\frac{40}{11}l \leq x \leq 4l \text{ සඳහා } \dot{x} = -\frac{2}{11}l \left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}\right) \sin\left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}t\right) \text{ වේ. (05)}$$

මෙම ලක්ෂ්‍යයේ දී P අංශුවේ ප්‍රවේගය


$$\text{එවිට, } \dot{x} = -\frac{2}{11}l \left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}\right) \sin\left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}t_0\right) = -\frac{2}{11}l \left(\sqrt{\frac{11\lambda}{6ml}}\right) \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{\frac{\lambda l}{22m}} \text{ වේ.}$$

(05)

(05)


[40]

13 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 57.1%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 35%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 20%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 26%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 19%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 5ක් ඇති අතර අවසාන අනුකොටස හැර අන් සියලු අනුකොටස්වල පහසුතා 40% හෝ ඊට වඩා වැඩි වේ. එම අනුකොටසෙහි පහසුතාව 22%කි. තුන්වන අනුකොටසෙහි පහසුතාව උපරිම වන අතර එය 86%කි.

- (13) සරල අනුවර්තී වලිතය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති අපේක්ෂකයන් පළමුවන කොටසට සාර්ථකව පිළිතුරු ලබා දී ඇත. ප්‍රශ්නයෙහි අවසාන කොටස්වලට පිළිතුරු සැපයීම දුර්වල මට්ටමක පැවතිණි. දී ඇති සමීකරණයේ විසඳුම සලකා (ii) සෙවිය යුතු නමුත් වලිත සමීකරණය නිරීක්ෂණයෙන් (ii) සඳහා අගය ලබා ගැනීම ද ලකුණු අඩුවීමට හේතුවකි. අවසාන කොටසට පිළිතුරු සැපයීම වඩාත් දුෂ්කර වී ඇති බව ද නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.

ප්‍රශ්නය කියවා නිසි ලෙස අවබෝධ කර නොගැනීම ද මූලික දැනුම අඩුවීම සහ යාන්ත්‍රිකරණයට හුරුවීම ද දුර්වල පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු වන බැවින්, එකම ප්‍රශ්නයකට වුව ද විවිධ ආකාරයට පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමට සිසුන් පෙලඹ විය යුතුය.

14 වන ප්‍රශ්නය

14.(a) A හා B යනු O ලක්ෂ්‍යයක් සමඟ එක රේඛීය නොවන ප්‍රමිත ලක්ෂ්‍ය දෙකක් යැයි ගනිමු. O ලක්ෂ්‍යය අනුබද්ධයෙන් A හා B ලක්ෂ්‍යවල පිහිටුම් දෛශික පිළිවෙළින් $\mathbf{a}$ හා $\mathbf{b}$ යැයි ගනිමු. D යනු $BD = 2DA$ වන පරිදි AB මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යය නම්, O ලක්ෂ්‍යය අනුබද්ධයෙන් D ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටුම් දෛශිකය $\frac{1}{3}(2\mathbf{a} + \mathbf{b})$ බව පෙන්වන්න.

$\vec{BC} = k\mathbf{a}$ ($k > 1$) හා O, D හා C ලක්ෂ්‍ය එක රේඛීය නම්, k හි අගය හා $OD : DC$ අනුපාතය සොයන්න. $\mathbf{a}$ හා $\mathbf{b}$ ඇසුරෙන් $\vec{AC}$ ප්‍රකාශ කරන්න.

තවද, AC ට සමාන්තරව O ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන රේඛාවට E හි දී AB හමුවේ නම්, $6DE = AB$ බව පෙන්වන්න.

(b) Ox හා Oy සාප්තෝණාසු කාටිසියානු අක්ෂ අනුබද්ධයෙන් A, B හා C ලක්ෂ්‍යවල ඛණ්ඩාංක පිළිවෙළින් $(\sqrt{3}, 0)$, $(0, -1)$ හා $(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 1)$ වෙයි. විශාලත්ව නිව්ටන $6P, 4P, 2P$ හා $2\sqrt{3}P$ වන බල පිළිවෙළින් OA, BC, CA හා BO පාද දිගේ, අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දක්වන දිශාවට ක්‍රියා කරයි. මෙම බලවල සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය හා දිශාව සොයන්න.

සම්ප්‍රයුක්තයේ ක්‍රියා රේඛාව y -අක්ෂය කපන ලක්ෂ්‍යය සොයන්න.

ඒ නමින්, සම්ප්‍රයුක්තයේ ක්‍රියා රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

විශාලත්වය නිව්ටන $6\sqrt{3}P$ වන වෙනත් බලයක් අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දක්වන දිශාවට AB දිගේ, බල පද්ධතියට යොදනු ලැබෙයි. විශාලත්වය නිව්ටන මීටර $10P$ වන යුග්මයකට බල පද්ධතිය උත්තනය වන බව පෙන්වන්න.

$$(a) \quad \vec{OD} = \vec{OA} + \vec{AD} = \mathbf{a} + \frac{1}{3}(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \frac{1}{3}(2\mathbf{a} + \mathbf{b}) \quad (05) \quad [15]$$

$$\vec{OC} = \mathbf{b} + k\mathbf{a} \quad (05)$$

O, D හා C එකරේඛීය බැවින්

$$\vec{OD} = \lambda \vec{OC} \quad \text{වේ. මෙහි } \lambda \text{ පරාමිතියකි.}$$

$$\text{එනම්, } \frac{1}{3}(2\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{b} + k\mathbf{a}) \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$(3\lambda k - 2)\mathbf{a} + (3\lambda - 1)\mathbf{b} = \mathbf{0}$$


$\mathbf{a}$ හා $\mathbf{b}$ යනු සමාන්තර නොවන දෛශික දෙකක් බැවින්

$$3\lambda k - 2 = 0 \quad \text{හා} \quad 3\lambda - 1 = 0 \quad (05) \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3} \quad (05) \quad \text{හා} \quad k = 2 \quad \text{ලැබේ.} \quad (05) \quad [20]$$

$$\vec{OD} = \lambda \vec{OC} \Rightarrow OD = \frac{1}{3}OC \Rightarrow OD = \frac{1}{3}(OD + DC) \Rightarrow 2OD = DC \Rightarrow OD : DC = 1 : 2 \quad (05) \quad [20]$$

$$\therefore \vec{OC} = \mathbf{b} + 2\mathbf{a}$$

$$\therefore \vec{AC} = \vec{AO} + \vec{OC} = -\mathbf{a} + (\mathbf{b} + 2\mathbf{a}) = \mathbf{a} + \mathbf{b} \quad (05)$$



F ලක්ෂ්‍යයේ දී BC හමුවන සේ OE රේඛාව දික් කරන්න.

එවිට, OE යන්න AC ට සමාන්තර බැවින් $OACF$ සමාන්තරාස්‍රයක් වේ.

$$\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{AC} = \mathbf{a} + \mathbf{b} \quad (05)$$

එබැවින්, $OAFB$ සමාන්තරාස්‍රයක් වේ.

එමනිසා, E යනු AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වේ. (05)

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -\frac{1}{3}(\mathbf{b} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \frac{1}{6}(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \quad (05)$$

$$6\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AB} \Rightarrow 6DE = AB$$

[20]

(b) Ox දිගේ බල විභේදනයෙන්

$$X = 6P + 4P \cos \frac{\pi}{3} + 2P \cos \frac{\pi}{3} = 9P \quad \text{ලැබේ. (10)}$$


Oy දිගේ බල විභේදනයෙන්

$$Y = 2\sqrt{3}P + 4P \sin \frac{\pi}{3} - 2P \sin \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3}P \quad \text{ලැබේ. (10)}$$

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{81P^2 + 27P^2} = 6\sqrt{3}P \quad (05)$$

$$\tan \theta = \frac{Y}{X} = \frac{3\sqrt{3}P}{9P} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{වේ. (05)}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} \quad \text{වේ. (05)}$$



$OD = d$ වන සේ D ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ සම්ප්‍රයුක්තය ගමන් කරයි යැයි සිතමු.

D වටා වාමාවර්තව ඝූර්ණ ගැනීමෙන්

$$4P \cos \frac{\pi}{3} \times (d+1) + 6P \times d + 2P \cos \frac{\pi}{3} \times d - 2P \sin \frac{\pi}{3} \times \sqrt{3} = 0 \quad \text{යැයි ලැබේ. (10)}$$

$$2 \times (d+1) + 6 \times d + 1 \times d - \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 0 \Rightarrow d = \frac{1}{9} \quad \text{යැයි ලැබේ. (05)}$$

[15]

O ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන කාටිසියානු ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක් අනුබද්ධයෙන් සම්ප්‍රයුක්තයේ ක්‍රියා රේඛාව මත ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක් (x, y) යැයි ගනිමු.

$$\text{එවිට, } \frac{y-d}{x} = \tan \frac{\pi}{6} \Rightarrow y - \frac{1}{9} = \frac{1}{\sqrt{3}}x \Rightarrow 9y - 3\sqrt{3}x - 1 = 0 \quad \text{වේ. (05)}$$

[05]

පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්තය හා AB දිගේ යොදන බලය සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ වේ.

$$\text{එබැවින්, පද්ධතිය විශාලත්වය } 6\sqrt{3}P \times \left(1 + \frac{1}{9}\right) \sin \frac{\pi}{3} = 10P \quad \text{නිව්වන මීටර වන ඝූර්ණයකට}$$


උභ්‍යන්‍ය වේ.

(05)

(05)


[10]

14 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 46.2%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 69%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 16%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 8%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 7%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 8ක් ඇති අතර, ඒවා අතුරෙන් පහසුතාව 25% ඉක්මවා ඇත්තේ අනුකොටස් හතරක් පමණි. වැඩිම පහසුතාව ඇත්තේ (a) හි පළමුවන අනුකොටසට වන නමුත් එය ද 50%ට සීමා වී ඇත. තවද (a) හි හතරවන කොටසෙහි පහසුතාව 2% කට සීමා වී ඇත.

මෙය අඩුවෙන්ම තෝරා ගනු ලැබ ඇති ප්‍රශ්නයයි.

(a) දෛශික අංකනය භාවිත කිරීමේදී දෛශික නිරූපණය කිරීම කෙරෙහි දක්වා ඇති සැලකිලිමත් බව ඉතාමත් අඩු ය. පළමුවන කොටසට සතුටුදායක ලෙස පිළිතුරු සපයා ඇති නමුත් ඉතිරි කොටස් සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේදී දෛශික පිළිබඳ දැනුම හා භාවිත හැකියාව ඉතාමත් අඩු බව පෙනේ. පිහිටුම් දෛශික පිළිබඳ අනුපාත ප්‍රමේයය යෙදීම නිසා ද ප්‍රශ්නයෙහි පළමුවන කොටසට ලකුණු අහිමි වූ බවක් දක්නට ලැබුණි. ඒක රේඛීය හෝ එකිනෙකට සමාන්තර හෝ දෛශික දෙකක් **a** හා **ka** ආකාරයෙන් ලිවීමත් (මෙහි **k** යනු අදිශ පරාමිතියකි.) සුදුසු අවස්ථාවලදී දෛශික ආකලනය පිළිබඳ ත්‍රිකෝණ නියමය යෙදීමත් කෙරෙහි සිසුන්ගේ අවධානය යොමු වූයේ නම් පිළිතුරු සැපයීම වඩා පහසු කර ගත හැකිව තිබිණි.

(b) දී ඇත්තේ සුපුරුදු ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක් වුව ද ප්‍රශ්නය මනාව අවබෝධ කර ගෙන නොතිබීම නිසා සතුටුදායක මට්ටමකට ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව දක්නට ලැබුණි.

දෛශික පිළිබඳ මූලික සංකල්ප සාධනය කරගෙන නොතිබීමත් ජ්‍යාමිතික දැනුම භාවිත කිරීමේ හැකියාව දුර්වලවීමත් සිසුන්ගේ පිළිතුරුවල දක්නට ලැබෙන හෙයින්, දෛශික පිළිබඳ මූලික සංකල්ප දියුණු වන පරිදි අභ්‍යාස කරවීම වඩාත් සුදුසු වනු ඇත.


15 වන ප්‍රශ්නය

15. (a) එක එකක බර W වන AB හා AC ඒකාකාර සමාන දඬු දෙකක්, A හි දී සුළඬ ලෙස සන්ධි කර ඇති අතර B හා C කෙළවරවල් සැහැල්ලු අවිනාශ තන්තුවක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත. එක එකක් නිරසට α කෝණයකින් ආනත සුමට තල දෙකක් මත B හා C කෙළවරවල් පිහිටන සේ දඬු පිරස් තලයක සමතුලිතතාවේ තබා ඇත; BC නිරස් වන අතර BC ට ඉහළින් A වෙයි. B හි ප්‍රතික්‍රියාව සොයන්න.

$\tan \theta > 2 \tan \alpha$ නම්, තන්තුවේ ආතතිය $\frac{1}{2} W(\tan \theta - 2 \tan \alpha)$ බව පෙන්වන්න; මෙහි $\hat{BAC} = 2\theta$ වේ.
 A සන්ධියේ ප්‍රතික්‍රියාව සොයන්න.

- (b) OA , OB , AC , AB හා BC සැහැල්ලු සමාන දඬු පහක්, රූපයේ දක්වන පරිදි රාමුකඩ්දාවක් සෑදෙන ආකාරයට, ඒවායේ කෙළවරවල්දී සුමට ලෙස සන්ධි කර ඇත.

රාමුකඩ්දාව O හි දී සුමට ලෙස අසවු කර ඇති අතර C හි දී නිව්ටන $5\sqrt{3}$ ක බරක් දරයි. OB නිරස් වන පරිදි A හි දී නිව්ටන් P වන නිරස් බලයක් මගින් රාමුකඩ්දාව පිරස් තලයක තබා ඇත.



- (i) P හි අගය සොයන්න.
 (ii) O හි ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වය හා දිශාව සොයන්න.
 (iii) බෝ අංකනය යෙදීමෙන්, රාමුකඩ්දාව සඳහා ප්‍රත්‍යාබල රූප සටහනක් ඇඳ, ආතති හා තෙරපුම් වෙන්කොට දක්වමින් දඬු සියල්ලෙහි ප්‍රත්‍යාබල සොයන්න.

- (a) එක් එක් දණ්ඩේ දිග $2a$ යැයි ගනිමු.

සිරසට බල විභේදනයෙන්

$$2R \cos \alpha = 2W \Rightarrow R = W \sec \alpha \text{ යැයි ලැබේ.}$$

(05) (05)


[10]

AB දණ්ඩේ සමතුලිතතාව සඳහා A වටා වාමාවර්තව සුර්ණ ගැනීමෙන්

$$T \cdot 2a \cos \theta + R \sin \alpha \cdot 2a \cos \theta + W \sin \theta - R \cos \alpha \cdot 2a \sin \theta = 0 \text{ ලැබේ. (10)}$$

$$2T + 2W \tan \alpha + W \tan \theta - 2W \tan \theta = 0 \text{ වේ. (10)}$$

$$T = \frac{W}{2} (\tan \theta - 2 \tan \alpha) \text{ වේ. (05)}$$



AB දණ්ඩේ සමතුලිතතාව සඳහා B වටා වාමාවර්තව සුර්ණ ගැනීමෙන්

$$X \cdot 2a \cos \theta - W \sin \theta = 0 \text{ ලැබේ. (05)}$$

$$\text{එනම්, } X = \frac{W}{2} \tan \theta \text{ වේ. (05)}$$


[10]

- (b) ඕනෑම දණ්ඩක දිග $2a$ යැයි ගනිමු.

O වටා සුර්ණ ගැනීමෙන්

$$P \cdot 2a \sin \frac{\pi}{3} - 5\sqrt{3} \cdot \left\{ 2a + 2a \cos \frac{\pi}{3} \right\} = 0 \text{ ලැබේ. (05)}$$

$$P = 15 \text{ N වේ. (05)}$$



[10]

O හි ප්‍රතික්‍රියාව R යැයි ද, R තිරස් සමඟ θ කෝණයක් සාදයි යැයි ද ගනිමු.

සිරස් බල විභේදනයෙන්

$$R \sin \theta = 5\sqrt{3} \text{ ලැබේ. (05)}$$

තිරස් බල විභේදනයෙන්

$$R \cos \theta = P = 15 \text{ ලැබේ. (05)}$$


$$R = \sqrt{75 + 225} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3} \text{ N වේ. (05)}$$

$$\tan \theta = \frac{5\sqrt{3}}{15} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} \text{ වේ. (05)}$$

[20]

එබැවින්, O හි ප්‍රතික්‍රියාව තිරස් සමඟ $\frac{\pi}{6}$ කෝණයක් සාදයි.

ප්‍රත්‍යාබල රූප සටහන :



[10]


දණ්ඩ	ප්‍රත්‍යාබලය	විශාලත්වය
OA	තෙරපුම	10 N
OB	තෙරපුම	10 N
AC	ආතතිය	5 N
AB	ආතතිය	10 N
BC	තෙරපුම	10 N

(25)

(25)


[50]

15 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 90.1%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 35%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 23%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 26%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 16%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 6ක් ඇති අතර ඒවා අතුරෙන් පහසුතාව 40%ට වඩා අඩුවන්නේ අනුකොටස් දෙකක පමණි. එම අනුකොටස් දෙකෙහි පහසුතාව 18%කට සීමා වී ඇත. වැඩිම පහසුතාව ඇත්තේ (b) (i) අනුකොටසට වන අතර එහි පහසුතාව 72%කි.

(15) සාපේක්ෂ වශයෙන් වැඩි සිසුන් පිරිසක් විසින් තෝරා ගනු ලැබ ඇති ප්‍රශ්නයකි. සමස්තයක් ලෙස ලකුණු ලබා ගැනීම ද වඩාත් සතුටුදායක ය.


(a) නිවැරදි බල රූප සටහනක් ඇඳ ගැනීමත්, පද්ධතියේ සම්මතිය සලකා බල ලකුණු කිරීමත් මගින් ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම වඩා පහසු කර ගත හැකිව තිබිණි.

(b) බෝ අංකනය යොදා ගනිමින් සම්පූර්ණ ප්‍රත්‍යාබල රූප සටහන නිවැරදිව ඇඳ ගැනීමත් රූප සටහනේ ආතති හා තෙරපුම් නිවැරදිව නිරූපණය කිරීමත් එම තොරතුරු නිවැරදිව වගුවෙහි දක්වමින් එකිනෙකට අනුරූප තොරතුරු සැසඳීමත් සැලකිලිමත්ව කරනු ලැබුවේ නම් ඉහළ ලකුණු ප්‍රමාණයක් පහසුවෙන් ලබාගත හැකිව තිබූ ප්‍රශ්නයයි.

දී ඇති තොරතුරු හොඳින් අවබෝධ කරගෙන, නිවැරදි බල රූප සටහන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේ ජ්‍යාමිතික දැනුම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් එම අවශ්‍යතාව සපුරාලනු පිණිස අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේ ජ්‍යාමිතික දැනුම පුළුල් අයුරින් සිසුන්ට ලබා දිය යුතුය.

16 වන ප්‍රශ්නය

16. උස h වූ ඒකාකාර ඝන සෘජු වෘත්තාකාර කේතුවක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, එහි සමමිති අක්ෂය මත, ආධාරකයේ සිට $\frac{1}{4}h$ දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.



රූපයේ දක්වන පරිදි එකට සවිකර ඇති ආධාරකයේ අරය $3r$ හා උස h වන සෘජු වෘත්තාකාර කේතුවකින් හා අරය r හා උස $2h$ වන සෘජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයකින් ඒකාකාර ඝන සංයුක්ත වස්තුවක් සමන්විත වෙයි.

සංයුක්ත වස්තුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, එහි සමමිති අක්ෂය මත, කේතුවේ ශීර්ෂයේ සිට $\frac{5}{4}h$ දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.

එක කෙළවරක් සිවිලිමකට හා අනෙක් කෙළවර කේතුවේ වෘත්තාකාර පතුලේ පරිධියෙහි A නම් ලක්ෂ්‍යයකට සවිකොට ඇති සැතැල්ලු අවිනාශ්‍ය තන්තුවක් මගින් සංයුක්ත වස්තුව සිරස් තලයක නිදහසේ ඵලලෙමින් තිබෙයි.

සංයුක්ත වස්තුවේ සමමිති අක්ෂය යටි අත් සිරස සමඟ α කෝණයක් සාදයි නම්, $\tan \alpha = \frac{12r}{h}$ බව පෙන්වන්න.

කේතුවේ ශීර්ෂයේදී සංයුක්ත වස්තුවේ සමමිති අක්ෂය දිගේ P නම් බලයක් යෙදීමෙන් සංයුක්ත වස්තුවේ සමමිති අක්ෂය තිරස් වන ආකාරයට සංයුක්ත වස්තුව සමතුලිතතාවේ තැබෙයි. P බලය හා තන්තුවේ ආතතිය, W හා α ඇසුරෙන් සොයන්න; මෙහි W යනු සංයුක්ත වස්තුවේ බර වෙයි.

සමමිතියෙන්, කේතුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය එහි සමමිති අක්ෂය මත පිහිටයි. (05)

$\bar{x}$ යනු කේතුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට එහි ශීර්ෂය වන O සිට ඇති දුර යැයි ගනිමු.

කේතුවේ ඝනත්වය ρ යැයි ගනිමු.


$$\frac{1}{3}\pi(h\tan\alpha)^2 h\rho\bar{x} = \int_0^h \pi(x\tan\alpha)^2 x\rho dx \quad (15)$$

(05)

$$\text{එනම්, } \frac{1}{3}h^3\bar{x} = \int_0^h x^3 dx = \frac{h^4}{4} \Rightarrow \bar{x} = \frac{3}{4}h \quad \text{වේ.} \quad (05)$$


එබැවින්, කේතුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, එහි අක්ෂය මත, ආධාරකයේ සිට $\frac{1}{4}h$ දුරකින් පිහිටයි.

(05) [40]



සමමිතියෙන්, සෘජු සහ වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G_2 , එහි සමමිති අක්ෂය මත, කේතුවේ O ශීර්ෂයේ සිට $2h$ දුරකින් පිහිටයි. (05)

පළමුවන කොටස අනුව කේතුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G_1 , එහි සමමිති අක්ෂය මත කේතුවේ O ශීර්ෂයේ සිට $\frac{3}{4}h$ දුරකින් පිහිටයි. (05)





සංයුක්ත වස්තුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G , එහි සමමිති අක්ෂය මත, කේතුවේ O ශීර්ෂයේ සිට x' දුරකින් වේ යැයි ගනිමු.

$$\left(\pi r^2 (2h) + \frac{1}{3} \pi (3r)^2 h \right) \rho x' = \left(\pi r^2 (2h) \right) (2h) \rho + \left(\frac{1}{3} \pi (3r)^2 h \right) \rho \left(\frac{3h}{4} \right) \quad (10) \quad (05) \quad (05) \quad (05) \quad (නිවැරදි සමීකරණයට)$$

$$5x' = 4h + \frac{9}{4}h \Rightarrow x' = \frac{5}{4}h \quad (05)$$

$$AB = 3r \text{ හා } BG = OG - OB = \frac{5h}{4} - h = \frac{h}{4} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$\tan \alpha = \frac{AB}{BG} = \frac{12r}{h} \quad (05)$$



ලාම් ප්‍රමේයය යෙදීමෙන්


$$\frac{P}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)} = \frac{T}{\sin\frac{\pi}{2}} = \frac{W}{\sin(\pi - \alpha)} \quad \text{ලැබේ.} \quad (15)$$

$$\frac{P}{\cos \alpha} = T = \frac{W}{\sin \alpha} \quad (05)$$

$$P = W \cot \alpha \quad (05) \text{ හා } T = W \operatorname{cosec} \alpha \quad \text{වේ.} \quad (05) \quad [40]$$

සමමිතියෙන්, සෘජු සහ වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G_2 , එහි සමමිති අක්ෂය මත, කේතුවේ O ශීර්ෂයේ සිට $2h$ දුරකින් පිහිටයි. (05)

පළමුවන කොටස අනුව කේතුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G_1 , එහි සමමිති අක්ෂය මත කේතුවේ O ශීර්ෂයේ සිට $\frac{3}{4}h$ දුරකින් පිහිටයි. (05)





සංයුක්ත වස්තුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G , එහි සමමිති අක්ෂය මත, කේතුවේ O ශීර්ෂයේ සිට x' දුරකින් වේ යැයි ගනිමු.

$$\left(\pi r^2 (2h) + \frac{1}{3} \pi (3r)^2 h \right) \rho x' = \left(\pi r^2 (2h) \right) (2h) \rho + \left(\frac{1}{3} \pi (3r)^2 h \right) \rho \left(\frac{3h}{4} \right) \quad (10) \quad (05) \quad (05) \quad (05) \quad (නිවැරදි සමීකරණයට)$$

$$5x' = 4h + \frac{9}{4}h \Rightarrow x' = \frac{5}{4}h \quad (05)$$

$$AB = 3r \text{ හා } BG = OG - OB = \frac{5h}{4} - h = \frac{h}{4} \quad \text{වේ.} \quad (05)$$

$$\tan \alpha = \frac{AB}{BG} = \frac{12r}{h} \quad (05)$$




ලාම් ප්‍රමේයය යෙදීමෙන්

$$\frac{P}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)} = \frac{T}{\sin\frac{\pi}{2}} = \frac{W}{\sin(\pi - \alpha)} \quad \text{ලැබේ.} \quad (15)$$

$$\frac{P}{\cos \alpha} = T = \frac{W}{\sin \alpha} \quad (05)$$


$$P = W \cot \alpha \quad (05) \text{ හා } T = W \operatorname{cosec} \alpha \quad \text{වේ.} \quad (05) \quad [40]$$

16 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 71.7%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 22%ක් පමණ ද, ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 24%ක් පමණ ද, ලකුණු 80 - 112 ප්‍රාන්තරයේ 37%ක් පමණ ද, ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 17%ක් පමණ ද, ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 4ක් ඇති අතර ඉන් එක් කොටසකවත් පහසුතාව 50% ඉක්මවා නැත. වැඩිම පහසුතාව ඇත්තේ තුන්වන අනු කොටසට වන අතර එහි පහසුතාව 47%කි. අඩුම පහසුතාව ඇත්තේ අවසාන අනුකොටසට වන අතර එහි පහසුතාව 15%ක් පමණි.

- (16) අඩුවෙන් තෝරා ගනු ලැබ ඇති ප්‍රශ්නයකි. සහ කේතුවක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයෙහි පිහිටීම ලබා ගැනීම මෙන්ම සහ සංයුක්ත සමමිතික වස්තුවක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම ලබා ගැනීම ද පන්ති කාමරයේදී සිද්ධාන්ත යටතේ සාකච්ඡා කරනු ලබන හෙයින් පූර්ව සූදානම මගින් ලකුණු ලබා ගත හැකිව තිබූ ප්‍රශ්නයකි. විද්‍යාත්මක අංශ පද්ධතියක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සෙවීමේදී මෙන් එක එක බැගින් එකතු කිරීම යන අර්ථයෙන් Σ සංකේතය භාවිත කර ආකලනය දැක්වීම තනි වස්තුවක් සඳහා සදොස් වන අතර ඒ වෙනුවට ඝනකමෙහි සීමාව ගුණය කරා එළඹෙන තුනී වෘත්තාකාර තැටිවල ඓක්‍යය යන අර්ථයෙන් Σ භාවිත කෙරෙන බව නොදැක්වීම නිසා ද සාධාරණ අංශ මාත්‍රයක් සඳහා $\bar{x}$ ආනතව ලකුණු කිරීම නිසා ද ලකුණු අහිමි වී තිබේ. කෙසේ වුව ද ප්‍රශ්නයෙහි මුල් කොටස්වලට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා තිබුණ ද, තත්ත්වයන් නිදහසේ එල්ලෙමින් සමතුලිතතාවෙහි පවතින වස්තුවක බල රූප සටහන එහි ජ්‍යාමිතික ලක්ෂණ නිරූපණය වන සේ නිවැරදිව ඇඳ ගැනීමට අසමත් වීම නිසා සාර්ථක ලෙස අවසාන පිළිතුරුවලට ළඟාවීමට නොහැකි වූ අවස්ථා බහුල බව අවධාරණය කළ යුතුය. මේ නිසා ප්‍රශ්නයෙහි අවසාන කොටස්වල පහසුතාව අඩු මට්ටමක පැවතියි.

අර්ථ දැක්වීම නිවැරදිව අවබෝධ කර ගෙන නොතිබීම, සන්නික වස්තුවල ස්කන්ධ කේන්ද්‍ර සෙවීමේදී $\sum_{i=1}^n$ යොදා විවික්ත ආකාරයෙන් ඵෙකාය සැලකීම හා දී ඇති රූප සටහනේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රවල පිහිටීම ලකුණු කර නොතිබීම කැපී පෙනෙන හෙයින්, සන්නික වස්තුවල ස්කන්ධ කේන්ද්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නිවැරදි සූත්‍ර භාවිතයට හුරු කිරීමත් සම්මත වස්තුවල වර්ගඵල සහ පරිමා සඳහා වන සූත්‍ර පිළිබඳ දැනුම ලබා දීමට කටයුතු කිරීමත් අත්‍යවශ්‍ය වේ. තවද තිරස, සිරස ලකුණු කිරීමේදී සම්මත ආකාරයට දැක්වීම ද පුහුණු කළ යුතුය.

17 වන ප්‍රශ්නය

17.(a) මල්ලක සුදු 5 ක්, කළු 3 ක් හා රතු 7 ක් වශයෙන් සර්වසම බෝල අඩංගු වෙයි. ප්‍රතිස්ථාපනය රහිතව බෝල තුනක් සසම්භාවී ලෙස මල්ලෙන් ගනු ලැබේ.

- (i) බෝල තුනම කළු වීමේ,
- (ii) බෝල තුනෙන් කිසිම බෝලයක් සුදු නොවීමේ,
- (iii) යටත් පිරිසෙයින් එක බෝලයක් සුදු වීමේ,
- (iv) බෝල වෙනස් වර්ණවලින් යුක්ත වීමේ,
- (v) කළු, රතු, ඊළඟට සුදු යන පටිපාටියට බෝල තුන ගැනීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

(b) එක්තරා පන්තියක සිසුන්ට සංඛ්‍යාතය ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දෙනු ලැබේ. මෙම සිසුන් ලබා ගන්නා ලද ලකුණු පහත දැක්වෙන සමූහික සංඛ්‍යාත වගුවෙහි දී ඇත:

ලකුණු පරාසය	සිසුන් ගණන
00 - 20	14
20 - 40	f_1
40 - 60	27
60 - 80	f_2
80 - 100	15

20-40 හා 60-80 ලකුණු පරාසවල සංඛ්‍යාත, වගුවෙහි දක්නට නොමැත. කෙසේ නමුත්, සමූහික සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ මාතය හා මධ්‍යස්ථය පිළිවෙලින් 48 හා 50 බව දනී. වගුවේ දක්නට නොමැති සංඛ්‍යාත දෙක ගණනය කරන්න.

ඒ හයින්, සංඛ්‍යාතය ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පෙනී සිටි මුළු සිසුන් ගණන ලබාගන්න.

සමූහික සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යන්‍යය හා සම්මත අපගමනය සොයන්න.

$$(a) (i) \quad P(BBB) = P(B)P(B|B)P(B|BB) = \frac{3}{15} \times \frac{2}{14} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{455}$$

(05)
(10)
(05)
[20]

$$\text{හෝ } P(BBB) = \frac{{}^3C_3}{{}^{15}C_3} = \frac{3!}{15 \times 14 \times 13} = \frac{1}{455}$$

(10)
(05)
(05)
[20]

$$(ii) P(W'W'W') = P(W')P(W'|W')P(W''|W'W') = \frac{10}{15} \times \frac{9}{14} \times \frac{8}{13} = \frac{24}{91}$$

(05) (10) (05) [20]

හෝ $P(W'W'W') = \frac{{}^{10}C_3}{{}^{15}C_3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{15 \times 14 \times 13} = \frac{24}{91}$

(10) (05) [20]

(iii) P (යටත් පිරිසෙයින් එක බෝලයක් සුදුවීම)

$$= 1 - P(\text{බෝල තුනෙන් කිසිවක් සුදු නොවීම}) \quad (05)$$

$$= 1 - \frac{24}{91} = \frac{67}{91}$$

(05) (05)

[15]

(iv) P (බෝල වෙනස් වර්ණවලින් යුක්ත වීම) $\frac{{}^5C_1 \times {}^3C_1 \times {}^7C_1}{{}^{15}C_3} = \left(\frac{5 \times 3 \times 7}{15 \times 14 \times 13} \right) 3! = \frac{3}{13}$

(05) (05) (05) [15]

(v) $P(BRW) = P(B)P(R|B)P(W|BR) = \frac{3}{15} \times \frac{7}{14} \times \frac{5}{13} = \frac{1}{26}$



(05) (05) [10]

(b) මධ්‍යන්‍යය = 50 නිසා මධ්‍යස්ථ පන්තිය 40 - 60 වේ.

$$14 + f_1 + \frac{27}{20} \times 10 = \frac{56 + f_1 + f_2}{2} \quad (10)$$

$$28 + 2f_1 + 27 = 56 + f_1 + f_2$$

එනම්, $f_1 - f_2 = 1 \rightarrow (1)$ වේ.



මාතය = 48 නිසා මාත පන්තිය 40 - 60 වේ.

$$\frac{27 - f_1}{27 - f_2} = \frac{48 - 40}{60 - 48} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \quad (10)$$

එනම්, $3f_1 - 2f_2 = 27 \rightarrow (2)$ වේ.

(1) හා (2) න්

$f_1 = 25$ (05) හා $f_2 = 24$ ලැබේ. (05)

[30]

සංඛ්‍යාතය ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පෙනී සිටි මුළු සිසුන් ගණන

$$= 56 + f_1 + f_2 = 56 + 25 + 24 = 105 \text{ වේ. (05)}$$

[05]

පන්ති ප්‍රාන්තරය	මැද අගය (x)	සංඛ්‍යාතය (f)	$d = \frac{x-50}{20}$	fd	fd^2
00 - 20	10	14	-2	-28	56
20 - 40	30	25	-1	-25	25
40 - 60	50	27	0	0	0
60 - 80	70	24	1	24	24
80 - 100	90	15	2	30	60
	මුළු ගණන	105		1	165

(05)

(05)

$$\text{මධ්‍යන්‍යය} = 50 + 20\bar{d} = 50 + 20 \times \frac{1}{105} = 50 + \frac{4}{21} = 50.19 \text{ වේ. (05)}$$

[10]


$$\text{විචලතාව} = 20^2 \left\{ \frac{1}{105} \sum_{i=1}^5 f_i d_i^2 - \left(\frac{\sum_{i=1}^5 f_i d_i}{105} \right)^2 \right\} = \left(\frac{20}{105} \right)^2 (165 \times 105 - 1) = 17324 \left(\frac{4}{21} \right)^2$$

(05) (05) (05)

$$\text{සම්මත අපගමනය} = \frac{4}{21} \sqrt{17324} = \frac{4 \times 131.62}{21} = 25.07 \text{ වේ. (05)}$$


[25]

17 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 54.1%කි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ. ඉන්

ලකුණු 00 - 35 ප්‍රාන්තරයේ 74%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 40 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 16%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 80 - 110 ප්‍රාන්තරයේ 7%ක් පමණ ද,
 ලකුණු 115 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 3%ක් පමණ ද,
 ලකුණු ලබාගෙන ඇත.



මෙහි අනුකොටස් 6ක් ඇති අතර ඉන් එක් කොටසකවත් පහසුතාව 32% ඉක්මවා නොමැත. වැඩිම පහසුතාව ඇත්තේ අවසාන (b) කොටසට වන අතර එයද 32%කට සීමා වී ඇත. අවම පහසුතාව ඇත්තේ (a)(iii) අනුකොටසට වන අතර එහි පහසුතාව 9%ක් පමණි.

- (17) (a) වැඩි වශයෙන් තෝරා ගනු ලැබ ඇති ප්‍රශ්නයක් වුව ද අපේක්ෂකයන් ප්‍රශ්නය නිවැරදිව තේරුම් ගෙන නොතිබීමත් සම්භාවිතාව පිළිබඳ ගුණන නීතිය නිවැරදිව නොයෙදීම හා අවසාන පිළිතුර සුළු නොකිරීමත් නිසා බොහෝ විට ලකුණු අහිමි වූ බවක් දක්නට ලැබුණි.
- (b) සංඛ්‍යානය භාවිතය පිළිබඳ දැනුම අල්පවීමත් මාතය සහ මධ්‍යස්ථය පිළිබඳ සූත්‍ර හා ව්‍යුත්පන්න කිරීම් නිවැරදිව යොදා නොගැනීමත් නිසා බොහෝ විට ලකුණු අහිමි වූ අවස්ථා දක්නට ලැබුණි.

නියැදි අවකාශයක සිද්ධි හැඳින්වීම සඳහා නිවැරදිව කුලක විජය යොදා ගැනීම, ස්වායත්ත සිද්ධි සිදුවීමේ සම්භාවිතා ගණනය කිරීම සඳහා ගුණන සූත්‍ර නිවැරදිව යොදා ගැනීම, පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ දී පියවර සඳහන් කිරීම, කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් හා විසිරීම පිළිබඳ මිනුම් සඳහා වන සූත්‍ර ව්‍යුත්පන්න කිරීම හා භාවිතය යන කරුණු කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු වන සේ එම මිනුම් සම්බන්ධ සූත්‍ර මතකයෙහි රැඳවීම සඳහා සුදුසු අභ්‍යාසවල සිසුන් නිරත කරවීම අවශ්‍ය වේ.

III කොටස

3.0 පිළිතුරු සැපයීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හා යෝජනා :

3.1. පිළිතුරු සැපයීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු :

පොදු උපදෙස් :

- ★ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඇති මූලික උපදෙස් කියවා හොඳින් තේරුම් ගත යුතුය. එනම් එක් එක් කොටසින් කොපමණ ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවකට පිළිතුරු සැපයිය යුතු ද කුමන ප්‍රශ්න අනිවාර්ය වේ ද කොපමණ ලකුණු ලැබේ ද කොපමණ කාලයක් ලැබේ ද යන කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු අතර, ප්‍රශ්න හොඳින් කියවා නිරවුල් අවබෝධයක් ඇති කර ගෙන ප්‍රශ්න තෝරා ගත යුතුය.
- ★ I පත්‍රයේත් II පත්‍රයේත් A කොටසෙහි සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
- ★ I පත්‍රයේත් II පත්‍රයේත් B කොටසෙහි ප්‍රශ්න 07ත් තෝරා ගත් ප්‍රශ්න 05කට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
- ★ සෑම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්ම අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ කළ යුතුය.
- ★ අයදුම්කරුගේ විභාග අංකය සෑම පිටුවකම අදාළ ස්ථානයේ ලිවිය යුතුය.
- ★ ප්‍රශ්න අංක හා අනුකොටස් අංක නිවැරදිව ලිවිය යුතුය.
- ★ සියලුම ප්‍රශ්න හොඳින් කියවා පිළිතුරු ලිවිය යුතුය. ප්‍රශ්න යටතේ දී ඇති තොරතුරුත්, ලබා ගත යුතු පිළිතුරු හෝ සාධනය කළ යුතු ප්‍රතිඵල කවරේ ද යන්නත් පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගත යුතුය.
- ★ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී දී ඇති කාලය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ගැනීමට වග බලා ගත යුතුය.
- ★ පිළිතුරු ලිවීමේදී රතු, කොළ හෝ දම් පාට පෑන් භාවිත කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය.

විශේෂ උපදෙස් :

- ★ රූප සටහන් ඇඳිය යුතු අවස්ථාවලදී ඒවා ඉතා පැහැදිලිව ඇඳ නම් කළ යුතුය. රූප සටහන්වල නිරවද්‍යතාව, සම්බන්ධතා දැකීමටත් ඒ ඇසුරින් පහසුවෙන් පිළිතුරු කරා එළඹීමටත් මහෝපකාරී වෙයි.
- ★ ගණනය කිරීම්වලදී එක් එක් පියවර පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු අතර, අවශ්‍ය ස්ථානවලදී පියවර අතර සම්බන්ධය දැක්වෙන සමාන ලකුණු හෝ වෙනත් අදාළ සංකේත හෝ ලියා දැක්වීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. එක් පියවරක හෝ පිටුවක හෝ ඇති ප්‍රකාශන හා සමීකරණ ඊළඟ පියවරට හෝ පිටුවට පිටපත් කිරීමේදී ඒවායේ නිරවද්‍යතාව පිළිබඳව ඉතා සැලකිලිමත් විය යුතුය.
- ★ අවශ්‍ය ස්ථානවලදී නිවැරදිව ඒකක භාවිත කළ යුතුය.
- ★ ප්‍රස්තාර ඇඳීමේදී X හා Y අක්ෂ නිවැරදිව නම් කර පරිමාණගත කළ යුතු අතර, අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඒකක ද සඳහන් කළ යුතුය.
- ★ මූලික සමානුපාත පිළිබඳ සංකල්ප නැවත පරිශීලනය කළ යුතුය.

නිදසුන් : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ නම්

$$(i) \frac{a + b}{b} = \frac{c + d}{d}$$

$$(ii) \frac{a - b}{b} = \frac{c - d}{d}$$

$$(iii) \frac{a - b}{a + b} = \frac{c - d}{c + d}$$

- ★ මූලික ජ්‍යාමිතිය පිළිබඳ දැනුම නැවත පරිශීලනය කළ යුතුය.

නිදසුන්: (1) සමාන්තරාස්‍රයක ලක්ෂණ
(2) රොම්බයක ලක්ෂණ
(3) සවිධි ඡඩ්‍රයක ලක්ෂණ
(4) මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය හා විලෝමය
(5) වෘත්ත ආශ්‍රිත ප්‍රමේය
(6) සමමිති ගුණ

- ★ සාධකවලට බිඳිය හැකි වර්ගජ ප්‍රකාශන එකවරම සාධකවලට වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කළ යුතුය.
- ★ “එනයින් අපෝහනය කරන්න, සත්‍යාපනය කරන්න, ව්‍යුත්පන්න කරන්න” වැනි යෙදුම් කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතු අතර, ඒ අනුව පිළිතුර කරා එළඹීමට වග බලා ගත යුතුය. ‘එනයින් හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ’ යනුවෙන් සඳහන් අවස්ථාවලදී බහුල වශයෙන්ම පෙර ලබා ගත් ප්‍රතිඵලය භාවිත කර ඊට පසු ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම වඩාත් පහසු වේ.
- ★ සෑම විටෙකදීම අවසාන පිළිතුර සරලම ආකාරයෙන් දැක්වීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය. අවසාන පිළිතුර, ප්‍රශ්නයෙහි අසා ඇති ආකාරය අනුව පැහැදිලිව දැක්විය යුතුය.
- ★ අපේක්ෂකයන් තම අත් අකුරු, ඉලක්කම් හා සංකේත පැහැදිලිවත් නිවැරදිවත් ලියා දැක්වීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය.
- ★ පිළිතුර කරා එළඹීමට අවශ්‍ය සුළු කිරීම් (සංඛ්‍යාමය, විජ්‍ය හෝ ත්‍රිකෝණමිතික) කටුවැඩ ලෙස සැලකුව ද පිළිතුර සමගම පසෙකින් ඉදිරිපත් කරන්න.
- ★ පිළිතුර සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි අවස්ථාවලදී වුව ද ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ලබා ගැනීමට අදාළ ඉදිරි පියවර ලියා දැක්වීම බොහෝවිට ඵලදායී විය හැකිය.
- ★ ප්‍රශ්නයක අග කොටස්වල පවා මුල් කොටස්වලින් ස්වාධීන වූ පහසු කොටස් තිබිය හැකි බැවින් ප්‍රශ්නයක මුල් කොටස අපහසු වුව ද ප්‍රශ්නය අත්හැර නොයා ඉතිරි කොටස් පිළිබඳව ද අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

3.2. ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අදහස් හා යෝජනා :

- ★ විෂය නිර්දේශ, ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ හා බාහිර සම්පත් මූලාශ්‍ර පිළිබඳව ගුරුභවතුන් මෙන්ම සිසුන් ද දැනුවත්වීම හා භාවිතය අවශ්‍ය ය.
- ★ තම විෂය දැනුම යාවත්කාලීන කර ගැනීමට හා සංවර්ධනය කර ගැනීමට ගුරුභවතුන් වග බලා ගත යුතුය.
- ★ සංයුක්ත ගණිතය වැනි විෂයයක් ඉගෙනීම විභාග කේන්ද්‍රීය නොවිය යුතු වුවත්, විභාගයේදී භාවිත කරනු ලබන ප්‍රශ්න පත්‍රවලින් ඉහළ ලකුණු ලැබීමට නම් මූලාකෘති ප්‍රශ්න මෙන්ම පෙර වර්ෂවල ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ලකුණු දීමේ පටිපාටි පරිශීලනය කර, එක් එක් ප්‍රශ්නයට වඩාත් සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයිය යුත්තේ කෙසේ දැයි යන්න පිළිබඳව සිසුන් මනා අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුය. මේ සඳහා සිසුන්ට මඟ පෙන්වීම ද ගුරු භවතුන්ගේ වගකීමක් ලෙස සැලකිය යුතුය.